

Vertragsnaturschutz Kennarten

Fachtable – Kennarten und Arten der Sammelgruppen

Stand: 2023

Nr	Kennarten-/gruppen (Blühzeitraum: später Termin oft im 2. Aufwuchs)	wissenschaftliche Namen/Gruppenbezeichnung und zugehörige Arten	Standorte
1	Baldrian, Echter (VI–VIII) und Kleiner (V–VI)	Valeriana dioica/officinalis agg.	frisch/feucht/nass
2	Beinwell (V–VII)	Symphytum spec.	frisch/feucht/nass
3	Blutwurz (= Tormentill) (V–IX)	Potentilla erecta	mittlere
4	Echtes Labkraut (VI–IX)	Galium verum	halbtrocken/trocken
5	Ehrenpreis (IV–X)	Veronica-Arten, die im Grünland vorkommen, z.B. Veronica chamaedrys/ teucrium/officinalis/longifolia	mittlere
6	Flockenblumen (VI–IX)	Gruppe „Flockenblumen“ alle rosa-violett (selten weiß)blütigen Centaurea-Arten und ähnlich aussehende Arten, z. B. Centaurea nigra/jacea/ angustifolia/scabiosa. Zusätzlich Serratula tinctoria, stachellose/-arme Cirsium-Arten, z. B. C. tuberosum ohne: Centaurea cyanus (Kornblume, blau), C. solstitialis (gelb) – andere Standorte	mittlere
7	Frauenmantel (V–VIII)	Alchemilla vulgaris	mittlere
8	Frühlingsprimel (IV–V)	Primula veris	mittlere
9	Gilbweiderich (VI–VIII)	Lysimachia vulgaris	frisch/feucht/nass
10	Ginster, kleine Arten (VI–VIII)	Genista pilosa/sagittale/tinctoria	halbtrocken/trocken
11	Glockenblumen (ohne Knäuel-Glockenblume) (V–X)	Gruppe „Glockenblumen“ alle Campanula-Arten (C. rotundifolia/ patula/persicifolia u. a.) ohne: Knäuelglockenblume (= Nr. 12 separat)	mittlere
12	Glockenblume: Knäuelglockenblume (VI–X)	Campanula glomerata	mittlere
13	Habichtskräuter und ähnliche, einköpfig (VI–X)	Gruppe „einköpfige Habichtskräuter u. a.“ Habichtskraut und optisch ähnliche Arten, mit einem Blütenköpfchen mit gelben oder orangenen Zungenblüten, z. B.: Hieracium pilosella, Leontodon hispidus. u. a. ohne: Taraxacum sp. (Löwenzahn)	halbtrocken/trocken
14	Habichtskräuter und ähnliche, mehrköpfig (VI–X)	Gruppe „mehrköpfige Habichtskräuter u. a.“ Habichtskraut und optisch ähnliche Arten, mit mehr als einem Blütenköpfchen mit gelben oder orangenen Zungenblüten, z. B.: Crepis biennis, Hypochaeris sp. (mehrköpfige Ferkelkräuter), Hieracium laevigatum, H. sylvaticum, H. umbellatum, H. aurantiacum, Picris hieracioides. Leontodon autumnalis, Sonchus oleraceus u.a	mittlere

15	Heilziest (VI–X)	Betonica officinalis	frisch/feucht/nass
16	Klappertopf, Großer und Kleiner (V–IX)	Rhinanthus minor/alectorolophus	mittlere
17	Klee – Hornklee, Wundklee (V–IX)	Gruppe „Klee: Hornklee, ... u.a.“ Lotus corniculatus/uliginosus, Anthyllis vulneraria, Lathyrus pratensis	mittel/feucht/ halbtrocken
18	Klee – roter Klee und kleine gelbe Kleearten (IV–X)	Gruppe „Roter Klee und kleine gelbe Kleearten“ Kleearten-Blüten in Köpfchen angeordnet, Blatt mit drei Fiederblättern: roter Klee: Trifolium pratense, T. medium und T. arvense (Hasenklee). Kleine gelbe: alle Kleearten mit kleinen gelben Blütenköpfchen, z. B. Trifolium dubium, T. campestre, T. aureum, Medicago lupulina u. a. ohne: Melilotus (Steinklee, Blüten in Trauben)	mittlere
19	Knöllchensteinbrech (IV–VI)	Saxifraga granulata	halbtrocken/trocken
20	Kriechender Günsel (IV–VI)	Ajuga reptans	mittlere
21	Mädesüß, Echtes, Kleines (V–X)	Filipendula ulmaria/vulgaris	frisch/feucht/nass
22	Margerite (V–IX)	Leucanthemum vulgare	mittlere
23	Nelken (rotblühende Arten) (IV–V feucht/V–VIII halbtrocken)	Gruppe „Rote Nelken“ Lychnis flos-cuculi, Lychnis viscaria, Dianthus spec. ohne: Silene dioica (Melandrium)	frisch-feucht/nass (halb)trocken
24	Orchideen (IV–VII)	Gruppe „Orchideen“ alle Wiesenorchideen, z. B. Dactylorhiza sp. und Orchis sp. (Knabenkräuter), Gymnadenia sp. (Händelwurz), Himantoglossum sp. (Riemenzunge), Ophris sp. (Ragwurz), Platanthera sp. (Waldhyazinthe)	mittlere
25	Platterbsen und Wicken: blau-violett, wenigblütig (IV–VII)	Gruppe „Platterbsen und Wicken“ inkl. Hauhechel alle blau-violetten-rosa wenigblütigen Wiesenarten (Blütenstand mit ca. 1-6 Blüten). Zur Gruppe gehören z.B.: Lathyrus montanus/palustris, Vicia sepium, Ononis spinosa/repens ohne: vielblütige Arten (Vicia cracca), ohne Arten, die oft durch Ansaatmischungen in Grünland vorkommen (Kronwicke, Esparsette, Luzerne...), Lathyrus pratensis (gelb blühend, s. Nr. 17)	feucht/mittel/trocken
26	Schafgarbe, Gemeine S., Sumpf-. (VI–X)	Achillea millefolium/ptarmica	mittlere/feucht
27	Schlangenknöterich (VI–X)	Polygonum bistorta	frisch/feucht/nass
28	Skabiosen u.ä. (VI–IX)	Gruppe „Skabiosen“ Skabiosen und ähnliche: Scabiosa columbaria, S. canescens, Knautia arvensis (Witwenblume), Succisa pratensis (Teufelsabbiss). (i.d.R. blau-/violett, selten weißblühend)	mittel/feucht/ halbtrocken

29	Storchschnabel, Wald-, Wiesen-(VI-IX)	<i>Geranium sylvaticum/pratense</i>	mittlere
30	Sumpfdotterblume (III-V)	<i>Caltha palustris</i>	frisch/feucht/nass
31	Sumpf-Vergissmeinnicht (V-X)	<i>Myosotis palustris</i>	frisch/feucht/nass
32	Teufelskralle (V-VIII)	<i>Phyteuma nigra/spicata</i> (violett- und weißblühend)	mittlere
33	Thymian (V-X)	<i>Thymus pulegoides/serpyllum</i>	(halb)trocken
34	Veilchen (III-V) und Kreuzblümchen (V-IX)	Alle Wiesenveilchen: <i>Viola canina/palustris/pumila/reichenbachiana/riviniana/hirta</i> <i>Polygala vulgaris/amara/amarella/serpyllifolia</i>	halbtrocken/mittel/ frisch-feucht
35	Wiesenbocksbart (V-VIII)	<i>Tragopogon spec. (pratense/dubius)</i>	mittlere/halbtrocken
36	Wiesenknopf, Kleiner und Großer (V-IX)	<i>Sanguisorba minor/officinalis</i>	halbtrocken/mittel/ feucht
37	Wiesensalbei (V-VIII)	<i>Salvia pratensis</i>	(halb)trocken
38	Wolfsmilch (IV-VIII)	<i>Euphorbia cyparissias/esula/palustris</i>	(halb)trocken/ feucht-nass

Hier handelt es sich um die aktualisierte Tabelle der Kennartenbroschüre (Ausgabe 2016, S. 34 ff.). Die neuen Arten-/gruppen und Änderungen sind grau markiert.

Bearbeitung: LfU