Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 16	Seite 445–479, 556–560	Oppenheim 1993
--	---------------------------	----------------

4.10 Beitrag zur Großschmetterlingsfauna (Insecta: Macrolepidoptera) des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr" und angrenzender Weinbergsbrachen

von OLIVER SCHMITZ, WILLIBALD SCHMITZ und FRANZ A. LADDA

Abstract

The macrolepidopterous fauna of the nature reserve "Ahrschleife bei Altenahr" and adjacent fallow-vineyards

The investigations were done within an extended registration program in the nature reserve "Ahrschleife bei Altenahr" (BÜCHS et al. 1989) supported by the "Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V." (GNOR). The paper describes the results of the registration of macrolepidoptera for the period of three years (1986-1988). Between 1986 and 1988 567 macrolepidoptera species were caught by many different methods. The number of species includes 92% of the 475 species, which were recorded between 1966 and 1980 (KINKLER et al. 1980). When the high number of 130 species discovered for the first time in this area is taken into account, the total number of the hitherto recorded macrolepidoptera is 605. According to the Red List of Rhineland-Palatinate (BLÄSIUS et al. 1987) there are 183 (30,2%) endangered species, and 21 species reach the northern border of their distribution areas in the western part of Germany. Furthermore structures of habitats, especially those of the xerothermophilic species, and habitat vulnerability are described. The lepidopterous fauna is discussed and a zoogeographical analysis is given. The necessity of biotop management in some parts of the nature reserve is pointed out.

Inhalt

4.10.1	Einleitung	446
4.10.2	Material und Methoden	446
4.10.3	Beschreibung der Lebensräume	447
4.10.3.1	Warme (Trockenwarme) Standorte	447
4.10.3.1.1	Offenland	447
4.10.3.1.1.1	Felsfluren	447
4.10.3.1.1.2	Weinbergsbrachen	448
4.10.3.1.2	Übergangsbereiche	448
4.10.3.1.2.1	Halbtrockenrasen, Ginsterheiden und Schlehengebüsche	448
4.10.3.1.3	Wald, Waldränder	448

4.10.3.1.3.1	Eichenniederwald, Eichenmischwald	448
4.10.3.1.3.2	Buchenniederwald, Buchenmischwald	449
4.10.3.1.3.3	Fichtendunkelwald	449
4.10.3.2	Feuchte Standorte	449
4.10.3.2.1	Offenlandbereiche	449
4.10.3.2.1.1	Ufer und Sandbänke	449
4.10.3.2.1.2	Mesophile Wiese	449
4.10.3.2.1.3	Hochstaudenfluren	449
4.10.3.2.2	Übergangsbereiche	450
4.10.3.2.2.1	Weidenbüsche	450
4.10.3.2.3	Wald, Waldränder	450
4.10.3.2.3.1	Auwald	450
4.10.3.2.3.2	Laubmischwald, Schluchtwälder	450
4.10.4	Ergebnisse	450
4.10.4.1	Artenliste	450
4.10.4.2	Besonders bemerkenswerte Schmetterlingsarten	467
4.10.4.3	Bewertung des Artenspektrums	471
4.10.4.4	Zoogeographische Analyse der Schmetterlingsfauna	472
4.10.5	Schlußbetrachtung	476
4.10.6	Zusammenfassung	476
4.10.7	Literatur	477

4.10.1 Einleitung

In diesem Beitrag zum Intensiverfassungsprogramm der Flora und Fauna im Naturschutzgebiet (NSG) "Ahrschleife bei Altenahr" (BÜCHS et al. 1989) werden die im Zeitraum 1986-1988 beobachteten Lepidopteren vorgestellt und mit den von KINKLER et al. (1980) publizierten Ergebnissen verglichen. Durch die intensive Erforschung von 1986-1988 ist die Anzahl der Neufunde für das Untersuchungsgebiet mit 130 Arten deutlich höher als die Zahl der nicht wiedergefundenen Arten (40 Spezies).

Auf eine detaillierte Beschreibung des Untersuchungsgebietes verzichten wir hier unter Verweis auf andere Beiträge dieser Monographie (BÜCHS 1993, FISANG 1993a, b, c, MEYER 1993). Nachfolgend werden jedoch die für Schmetterlinge wichtigen Biotope und ihre Gefährdungsdiskpositionen beschrieben sowie die typischen Arten des entsprechenden Lebensraumes erwähnt.

In der Lepidopterologie lassen sich zwar Lebensraumpräferenzen angeben, aber keine Zugehörigkeit der Arten zu bestimmten Pflanzengesellschaften. Dieses ist darauf zurückzuführen, daß die Arten vor allem an mikroklimatische Bedingungen und nicht in erster Linie an die Futterpflanzen gebunden sind. Die meisten Schmetterlinge sind nicht monophag, und selbst bei den als monophag geltenden Arten kann die Nahrungspflanze der Raupen regional bzw. überregional unterschiedlich sein. Deshalb ist eine kategorische Zuordnung zu den jeweiligen Futterpflanzen und damit zu einer speziellen Pflanzengesellschaft nicht sinnvoll.

4.10.2 Material und Methoden

Die Schmetterlinge wurden einerseits mit den klassischen Methoden wie Tag-, Licht- und Köderfang beobachtet (KOCH 1988). Darüber hinaus wurden eine Reihe von Arten durch Malaise- und Oliver-Fallen sowie mit Bodenemergenzeklektoren und Bodenphotoeklektoren (Standortbeschreibungen und Funktionsweise der Fallen: BÜCHS 1993, RISCH 1993, SORG 1993) nachgewiesen. So konnte

z.B. *Diplodoma herminata* ausschließlich mit Borkenemergenzeklektoren entdeckt werden. Die nachfliegenden Arten lassen sich mit Hilfe der Köder- und Lichtfangmethode nachweisen. Von uns wurden für den Lichtfang vorwiegend Mischlichtlampen sowie superaktinische und Schwarzlichtröhren verwendet. Als Köderfang bezeichnet man die Anlockung von Insekten durch Duftstoffe, z.B. Blütendüfte oder künstlich hergestellte Duftträger. Diese Methode kommt hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst zur Anwendung, also in Zeiten, in denen natürliche Nahrungsquellen für die Nachtfalter nur begrenzt vorhanden sind. Benutzt wurden von den Mitarbeitern selbst hergestellte Ködermischungen, z.B. zuckergesättigter Rotwein (KOCH 1988).

Darüber hinaus gibt es eine Reihe tagaktiver Heterocera (Nachtfalter im weiteren Sinne), die nur durch gezielte Suche nachzuweisen sind. Es handelt sich in erster Linie um die Vertreter der Psychidae (Sackträger) mit vielen parthenogenetischen Arten, die häufig nur anhand ihrer Säckchen (vergleichbar mit den Köchern der Köcherfliegenlarven, Trichoptera) determiniert werden können. Die erst in den letzten Jahren in Lepidopterologenkreisen verstärkt eingesetzte und mittlerweile etablierte Methode der Anlockung von Glasflüglern (Fam. Sesiidae) durch Pheromone (Sexuallockstoffe) fand im Untersuchungszeitraum noch keine Anwendung, so daß diese Gruppe stark unterrepräsentiert ist und mit einer Anzahl weiterer Arten im Gebiet gerechnet werden muß.

4.10.3 Beschreibung der Lebensräume

Schmetterlinge bewohnen die verschiedensten Biotope, welche bezüglich ihres Mikro- und Makroklimas differieren. Im Folgenden soll ein Überblick über die Mannigfaltigkeit der Biotope im Untersuchungsgebiet dargestellt werden. Dabei werden die besonderen, für die Biotope charakteristischen Arten aufgeführt. Gemäß ihren Lebensraumansprüchen erfolgt in Anlehnung an BLAB & KUDRNA (1982) eine Einteilung in typische Offenlandbewohner mit allen Übergängen bis hin zu typischen Waldbewohnern. Außerdem zeigen die einzelnen Arten unterschiedliche Präferenzen für trocken-warme bis feuchtkühle Standorte.

Die große Vielfalt an Biotopen im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" bedingt, daß neben faunistisch bemerkenswerten Arten auch eine ausgesprochene Artenvielfalt zu verzeichnen ist. Im Naturschutzgebiet konzentrieren sich die feuchten Bereiche auf die Talsohle, die trockenen Bereiche auf die Steilhänge und Bergrücken. Das Ahrtal stellt als nördlichstes Rotweinanbaugebiet Westdeutschlands für viele xerothermophile Arten die nördliche (bzw. im atlantisch beeinflussten Bereich nordwestliche) Verbreitungsgrenze dar. Dazu gehören u.a.: *Satyrium acaciae* (Kleiner Schlehenzipfelfalter, Lycaenidae), *Eilema caniola* (Gelbsaum-Flechtenspinner) und *Arctia villica* (Schwarzer Bär, beide: Arctiidae), *Cucullia xeranthemi* (Noctuidae), die *Idaea*-Arten *I. moniliata*, *I. eburnata* und *I. dilutaria*, sowie *Nebula salicata*, *Perizoma hydrata* (Leimkraut-Kapselspanner) und *Gnophos pullatus* (Blaugrauer Felsen-Steinspanner, alle: Geometridae). Sämtliche o.g. Arten gelten nach der Roten Liste Rheinland-Pfalz (im Folgenden RL abgekürzt) als "stark gefährdet" (BLÄSIUS et al. 1987). Die folgenden Angaben zur Gefährdung beziehen sich immer auf die Rote Liste Rheinland-Pfalz und - falls nicht ausdrücklich erwähnt - immer auf die vorher genannte Art.

4.10.3.1 Warme (Trockenwarme) Standorte

4.10.3.1.1 Offenland

Als Offenland bezeichnet man die Standorte, die weitgehend baum- bzw. buschfrei sind.

4.10.3.1.1.1 Felsfluren

Felsfluren werden hier definiert als offene Felsbereiche mit nur spärlicher Vegetation. Mikroklimatisch sind es die trockenwarmsten Standorte im NSG "Ahrschleife bei Altenahr". Im Rheinland sind

nur wenige Standorte solcher Ausprägung zu finden. Diese Bereiche können nur Spezialisten bewohnen, wie z.B. *Cucullia xeranthemi* und *Cryphia ravula* (Wandflechten-Algeneule, beide: Noctuidae) sowie *Idaea dilutaria*, *Gnophos pullatus* und *Gnophos furvatus* (Aschgrauer Steinspanner, alle: Geometridae).

Durch die im Gebiet um Altenahr noch recht extensive Weinwirtschaft und die natürliche Baum- und Buschfreiheit sind diese Standorte weitestgehend ungefährdet. Diesen Biotoptyp findet man z.B. im Norden von W 3 (Karte des Untersuchungsgebietes s. bei BÜCHS 1993) oberhalb der Kläranlage.

4.10.3.1.1.2 Weinbergsbrachen

Aufgelassene Weinberge stellen ebenso wie die Felsfluren Xerothermbiotope dar. Die Vegetation deckt den meist felsigen oder gerölligen Untergrund ab. Dieser Biotoptyp findet sich beispielsweise bei Altenburg in W 1. Typische Bewohner dieser Bereiche sind der Segelfalter (*Iphiclides podalirius*, Papilionidae, Abb. 4.10/7a-c, S. 559), der Kleine Schlehen-Zipfelfalter (*Satyrium acaciae*, Lycaenidae, Abb. 4.10/8, S. 560), der Schwarze Bär (*Arctia villica*, Arctiidae) und eine Reihe Cucullien (Noctuidae). Da eine Tendenz zur Verbuschung durch *Rubus* (Brombeere und Himbeere), *Prunus* (Schlehe und Weichselkirsche) und andere Gehölze trockenwarmer Standorte besteht, ist zur Erhaltung dieser typischen Standorte als Pflegemaßnahme die Entfernung von Buschwerk erforderlich.

4.10.3.1.2 Übergangsbereiche

4.10.3.1.2.1 Halbtrockenrasen, Ginsterheiden und Schlehengebüsche

Diese Flächen sind überwiegend bereits lange Zeit ungenutzte Bereiche. Sie sind meist durch extensive Beweidung (Schafe) entstanden. Nur Büsche mit "Verbißschutz", z.B. Dornen, konnten hier wachsen und überleben, so die Schlehen, Brombeeren und der Ginster (*Prunus*, *Rubus* und *Sarothamnus*). Die Bereiche zwischen den Büschen, also die offenen Bereiche, sind bei extensiver Bewirtschaftung meist sehr reich an Pflanzenarten und weisen daher einen ausgeprägten Blütenhorizont auf. Durch die fehlende extensive Nutzung sind gerade diese Flächen im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" durch die Überhandnahme von Büschen sehr stark bedroht. Am eindrucksvollsten ist die Ginsterheide auf der Krähhardt vertreten.

Typische Bewohner sind hier der Segelfalter (*Iphiclides podalirius*), der Pflaumen-Zipfelfalter (*Fixsenia pruni*) und der Nierenfleck-Zipfelfalter (*Thecla betulae*, Abb. 4.10/1, S. 556, beide: Lycaenidae), der Baumweißling (*Aporia crataegi*, Pieridae, Abb. 4.10/2, S. 556), *Egira conspiciellaris* und *Valeria oleagina* (Noctuidae) sowie *Agriopsis bajaran* (Geometridae). Als Pflegemaßnahme wird eine Mahd und eine teilweise Entbuschung empfohlen. Auch eine extensive Beweidung wäre eine Maßnahme zur Erhaltung dieser Flächen.

4.10.3.1.3 Wald, Waldränder

4.10.3.1.3.1 Eichenniederwald, Eichenmischwald

Diese im Mittelgebirgsraum weitverbreitete Waldform beherbergt eine Reihe von Schmetterlingen. Die im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" anzutreffenden trockenwarmen Bereiche mit Krüppel-eichenbeständen sind charakteristisch für Mittelrhein und Mosel sowie deren Seitentäler.

Typische Bewohner sind der Eichen-Zipfelfalter (*Quercusia quercus*, Lycaenidae), der Eichen-Spinner (*Lasiocampa quercus*, Lasiocampidae), die Grüne Eicheneule (*Dichonia aprilina*) und der Eichenkarmin (*Caiocala sponsa*, beide: Noctuidae). Gerade die trocken-warmen Bereiche der Eichenkrüppelwälder befinden sich in ausgeprägten Steillagen und sind daher forstwirtschaftlich nicht nutzbar. Eine Gefährdung ist deshalb nicht gegeben. Man findet diesen Waldtyp am Rand der Krähhardt (H) sowie auf dem Bergrücken zwischen den West- und Osthängen (W 1 / O 1, W 2 / O 2).

4.10.3.1.3.2 Buchenniederwald, Buchenmischwald

Es ist eine typische und häufig anzutreffende Waldform der Mittelgebirge. Viele im Buchenmischwald beheimatete Arten sind auch in anderen Laubmischwäldern zu finden. Typische Bewohner des Buchenmischwaldes sind der Nagelfleck (*Agria tau*, Attacidae), *Drepana cultraria* (Drepanidae) und *Operophtera fagata* (Geometridae). Diese Waldform ist nur durch Kahlschlag und Wiederaufforstung mit Nadelhölzern potentiell gefährdet.

4.10.3.1.3.3 Fichtendunkelwald

Diesen Biotoptyp stellen wir zu den trockenwarmen Standorten, da er eher zu den trockensten als zu den feuchten Bereichen zählt. Da es sich um eine allenthalben verbreitete Forstgesellschaft handelt, kann von einer Gefährdung nicht ausgegangen werden.

In Fichtenmonokulturen, die einen Unterwuchs nicht hochkommen lassen, sind nur Bewohner zu finden, die sich auf *Picea abies* (Fichte) ernähren, so z.B. die Nonne (*Lymantria monacha*, Lymantriidae) und der Tannen-Staubbandspanner (*Puengeleeria capreolaria*, Geometridae). Erstere Art war früher ein gefürchteter Nadelwaldschädling.

4.10.3.2 Feuchte Standorte

4.10.3.2.1 Offenlandbereiche

4.10.3.2.1.1 Ufer und Sandbänke

Sie sind vegetationsfrei und in trockenen Sommern an heißen Tagen ein willkommener Saugplatz für viele Schmetterlinge, um ihren Feuchtigkeitsbedarf zu decken.

4.10.3.2.1.2 Mesophile Wiese

Hierbei handelt es sich um eine ehemals extensiv genutzte Wiesenfläche im Süden von AU 2, die aufgrund ihres Reichtums an Blütenpflanzen einen begehrten Saugplatz für alle Tagfalter darstellt. Kleinere Bereiche mit ähnlichem Charakter repräsentieren alle Wegränder.

Hier finden sich viele weit verbreitete Wiesenbewohner wie der Schornsteinfeger (*Aphantopus hyperantus*), das Große Ochsenauge (*Maniola jurtina*) und das Kleine Wiesenvögelchen (*Coenonympha pamphilus*, alle: Satyridae). Als Besonderheit wurde auch der Dukatenfalter (*Lycaena virgaureae*, Abb. 4.10/3, S. 557) beobachtet.

4.10.3.2.1.3 Hochstaudenfluren

Im Naturschutzgebiet sind weite Bereiche an der Ahr mit riesigen Pestwurzbeständen (*Petasites hybridus*) bewachsen. Kleinere Bereiche in Ahrnähe zeigen vor allem blütenreiche Stauden von *Mentha* (Minze), *Eupatorium* (Wasserdost) und *Arctium* (Klette). Die genannten Pflanzen dienen vielen Lepidopteren zur Nektaraufnahme.

Bewohner sind *Thumatha senex* (Arctiidae), *Apamea unanimitis*, *Hydraecia micacea*, die Graue Sumpfeule (*Athetis pallustris*) und das Schwarze Ordensband (*Mormo maura*, alle: Noctuidae) sowie der Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (*Brenthis ino*, Nymphalidae, Abb. 4.10/4, S. 557).

Als Pflegemaßnahme in diesen Überschwemmungsbereichen wäre die Freihaltung von Weidenbüsch erforderlich, um den offenen Charakter dieser Habitats zu erhalten.

4.10.3.2.2 Übergangsbereiche

4.10.3.2.2.1 Weidengebüsche

Im Übergang zum eigentlichen Auwald finden sich häufig kleinere Weidengebüsche. Hieran sind die Raupen der Gabelschwanz-Arten *Cerura vinula* (Großer Gabelschwanz) und *Furcula furcula* (beide: Notodontidae) nicht selten zu finden.

4.10.3.2.3 Wald, Waldränder

4.10.3.2.3.1 Auwald

Folgt man dem Ahrschleifenrundweg in der Talaue, kommt man durch Waldbereiche mit *Alnus* (Erle), *Salix* (Weide), *Populus* (Pappel), *Fraxinus* (Esche) und *Populus tremula* (Espe), Baumarten, die für Hart- und Weichholzauewälder typisch sind.

Bewohner sind der Ulmen-Zipfelfalter (*Satyrium w-album*, Lycaenidae, Abb. 4.10/9, S. 560), der C-Falter (*Polygonia c-album*), das Landkärtchen (*Araschnia levana*, beide: Nymphalidae) und der Espen-Zickzackspinner (*Tritophia tritophus* = *Notodonta phoebe*, Notodontidae).

Die drei letztgenannten Biotoptypen, die im Untersuchungsgebiet in AU 1 / AU 2 / AU 3 vertreten sind, gehören zum Hochwasserbereich der Ahr. Regelmäßige Hochwasser sind Voraussetzung für die Erhaltung dieser Flächen. Eindämmung bzw. Aufstauung der Ahr würde zur Vernichtung dieses in Deutschland ohnehin schon seltenen Biotoptyps führen.

4.10.3.2.3.2 Laubmischwald, Schluchtwälder

Diese ehemals weiter verbreitete Waldform in Mitteleuropa wurde leider in vielen Gegenden zu Fichtenmonokulturen umgewandelt. Eine besondere Erwähnung verdienen die im Naturschutzgebiet vertretenen feuchten Schluchtwaldbereiche, die in weiten Teilen der Mittelgebirge zu Weiden umfunktioniert worden sind. Diese Laubmischwälder befinden sich auf den schattseitigen Hängen im Gebiet und sind nicht unbedingt an die Kerbtälchen gebunden. Vor allem in N 1 (Winterhardt), dem südlichsten Teil des Naturschutzgebietes, trifft man auf diesen Biotoptyp. Als Pflegemaßnahme wird die Vermeidung von forstwirtschaftlicher Nutzung empfohlen.

Typische Bewohner dieser Wälder sind der an Salweide lebende Große Schillerfalter (*Apatura iris*, Abb. 4.10/5, S. 558), der auf Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) spezialisierte Kleine Eisvogel (*Limenitis camilla*, Abb. 4.10/6, S. 558, beide: Nymphalidae) und der Schönbär (*Callimorpha dominula*, Arctiidae) sowie der Haarschuppenspinner (*Ptilophora plumigera*, Notodontidae) an *Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), die Waldfarn-Smaragdeule (*Phlogophora scita*, Noctuidae) mit der Futterpflanze *Dryopteris filix-mas* (Wurmfarn) und der Linden-Blütenspanner (*Eupithecia egenaria*, Geometridae) an *Tilia* (Linde).

4.10.4. Ergebnisse

4.10.4.1 Artenliste

In Tab. 4.10/1 erfolgt eine Auflistung aller bislang im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten unter Berücksichtigung der Gefährdungsdiskpositionen und relativen Häufigkeiten.

Legende zu den Abkürzungen in Tab. 4.10/1:

- Häufigkeit: die Angaben beziehen sich jeweils auf die maximal pro Tagesexkursion bzw. pro Nachtfang von einem Beobachter nachgewiesenen Exemplare einer Art (Angabe für den Untersuchungszeitraum 1986-1988)

s: selten (1-3 Individuen)

v: vereinzelt (4-10 Individuen)

h: häufig (>10 Individuen)

- Vergleich zu den Artnachweisen im Beobachtungszeitraum 1966

- 1980 (KINKLER et al. 1980):

- + Neufunde im Beobachtungszeitraum 1986-1988

- Art nicht wiedergefunden.

Die nicht näher gekennzeichneten Arten konnten in beiden Beobachtungszeiträumen nachgewiesen werden.

- Biotoppräferenzen: Eine Zuordnung erfolgt nur für die Arten, die im Untersuchungsgebiet eine deutliche Präferenz für bestimmte Biotoptypen aufweisen, in jedem Falle für die nach der Roten Liste gefährdeten Spezies, aber nicht für ubiquitär verbreitete Arten oder solche, deren Präferenzen für bestimmte Biotopstrukturen nicht erkennbar waren.

X xerotherme Felsfluren, Weinbergsbrachen und Standorte mit ähnlichen mikroklimatischen Verhältnissen

H Halbtrockenrasen, Ginsterheiden und verbuschende Saumgesellschaften sonnenexponierter Hanglagen

W naturnahe Waldgesellschaften (Laubmischwald) unterschiedlicher Ausprägung einschl. der Waldsäume und -lichtungen

N Nadelwald (Fichtenhochwald und Kiefernauflorungen)

T Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren des Ahrtales sowie Auenwaldgesellschaften

- Verbreitung

- * Art erreicht im Untersuchungsgebiet die nördliche bzw. nordwestliche Grenze ihrer Verbreitung in Westdeutschland

M Wanderfalter bzw. wanderverdächtige Art

- Die Angaben zur Zoogeographie folgen den Arbeiten von DE LATTIN (1957) und DE LATTIN et al. (1959-1966) und beziehen sich auf die bei uns heimischen Refugialrassen (s. Text). Die von DE LATTIN (1957, 1959-1966) unterschiedenen Faunenelemente wurden folgendermaßen zusammengefaßt:

med holomediterran

kas kaspisch

atl atlantisch/atlantomediterran

sib sibirisch/mongolisch/mandschurisch

adr adriatomediterran

eur mittel- und nordeuropäisch/gesamteuropäisch

pon pontisch/pontomediterran

euras eurasiatisch

Systematik und Nomenklatur folgen der Arbeit von LERAUT (1980). Hierbei wurden Änderungen, die den neuesten Erkenntnissen entsprechen, berücksichtigt, so z.B. die Erhebung von *Mesapamea didyma* und *Horisme radicularia* in den Artstatus. Die bei FORSTER & WOHLFAHRT (1955-1981) synonym verwendeten Artnamen wurden den Leraut'schen Namen in Klammern hinzugefügt, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Die angegebenen deutschen Namen wurden - soweit vorhanden - der Roten Liste Rheinland-Pfalz (BÄSIUS et al. 1987) bzw. verschiedenen Standard-Bestimmungswerken (z.B. HIGGINS 1978 und FORSTER & WOHLFAHRT 1955-1981) entnommen.

Tab. 4.10/1(1): Liste der im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" nachgewiesenen Großschmetterlingsarten

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.	Neufunde		
Fam.: Hepialidae					
<i>Hepialus humuli</i> L., 1758	Hopfen-Wurzelbohrer		+ s	T	sib
<i>Triodia sylvina</i> L., 1761			+ v		med
<i>Phymatopus hecta</i> L., 1758	Heidekraut- Wurzelbohrer	A.4	+ s	W	sib
<i>Korscheltellus lupulinus</i> L., 1758			+ v		med
Fam.: Cossidae					
<i>Zeuzera pyrina</i> L., 1761	Blausieb		s		med
<i>Cossus cossus</i> L., 1758	Weidenbohrer		s	T	sib
Fam.: Zygaenidae					
<i>Adscita statices</i> L., 1758			+ v		med
<i>Zygaena viciae</i> D. & S., 1775 (= <i>Thermophila meliloti</i> ESP.)	Steinklee-Widderchen	A.3	+ s	W	med
<i>Zygaena trifolii</i> ESP., 1783	Klee-Widderchen	A.4	s	T	atl
Fam.: Limacodidae					
<i>Apoda limacodes</i> HFN., 1766				h	W
<i>Heterogenea ascella</i> D. & S., 1775	Kleine Schildmotte	A.2	+ s	W	med
Fam.: Psychidae					
<i>Narycia monilifera</i> GEOFF. in FOURCR., 1785				v	?
<i>Brevantennia triquetrella</i> HB., [1813]				h	?
<i>Diplodoma herminata</i> GEOFF. in FOURCR., 1785			+ s		?
<i>Taleporia tubulosa</i> RETZ., 1783				h	?
<i>Eumasia parietariella</i> H.-S., 1855	Gräuliche Sackmotte	A.3	-	X	* ?
<i>Luffia serchaultella</i> STPH., 1850	Felsen-Sackträger	A.2		h	X * ?
<i>Psyche casta</i> PALL., 1767				h	med
<i>Psyche crassiorella</i> BRD, 1853			-		H
<i>Psyche betulina</i> Z., 1839				s	sib
<i>Epichnopterix plumella</i> D. & S., 1775 (= <i>E. pulla</i> ESP.)	Wiesen-Sackträger	A.4	v	H	sib
<i>Sterrhopterix fusca</i> HW., 1809 (= <i>S. hirsutella</i> HB.)	Rauhbehaarter starr- flügeliger Sackträger	A.3	+ s	W	sib
<i>Lepidopsyche unicolor</i> HFN., 1766	Einfarbiger Dick- sackträger	A.4	s	H	sib
Fam.: Sesiidae					
<i>Sesia apiformis</i> CL., 1759			+ s	T	med
<i>Chamaesphexia empiformis</i> ESP., 1783			+ s	H	?
Fam.: Hesperiiidae					
<i>Carterocephalus palaemon</i> PALL., 1771	Gelbwürfelig Dickekopffalter	A.4	+ v	T	sib
<i>Thymelicus sylvestris</i> PODA, 1761	Braunkolbiger Braundickkopffalter			h	med

Tab. 4.10/1(2)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
<i>Thymelicus lineolus</i> O., 1808	Schwarzkolbiger Braundickkopffalter		s	H	med
<i>Ochlodes venatus</i> BREMER & GREY, 1853	Rostfarbiger Dickkopffalter		v		med
<i>Pyrgus malvae</i> L., 1758	Kleiner Würfel- Dickkopffalter		s	H	sib
Fam.: Papilionidae					
<i>Papilio machaon</i> L., 1758	Schwalbenschwanz	A.3	s	H	med
<i>Iphiclides podalirius</i> SCOP., 1763	Segelfalter	A.1	s	X *	pon
Fam.: Pieridae					
<i>Gonepteryx rhamni</i> L., 1758	Zitronenfalter		h	W	med
<i>Aporia crataegi</i> L., 1758	Baumweißling	A.3	s	H	med
<i>Pieris brassicae</i> L., 1758	Großer Kohlweißling		v		med
<i>Pieris rapae</i> L., 1758	Kleiner Kohlweißling		v		med
<i>Pieris napi</i> L., 1758	Rapsweißling		h		med
<i>Anthocharis cardamines</i> L., 1758	Aurorafalter		h		med
Fam.: Nymphalidae					
<i>Apatura iris</i> L., 1758	Großer Schillerfalter	A.3	s	W	sib
<i>Limnitis camilla</i> L., 1764	Kleiner Eisvogel	A.4	s	W	sib
<i>Nymphalis polychloros</i> L., 1758	Großer Fuchs	A.3	v	W	med
<i>Inachis io</i> L., 1758	Tagfauenaug		v		med
<i>Vanessa atalanta</i> L., 1758	Admiral		v		M med
<i>Cynthia cardui</i> L., 1758	Distelfalter		+	v	M med
<i>Aglais urticae</i> L., 1758	Kleiner Fuchs		h		sib
<i>Polygonia c-album</i> L., 1758	C-Falter		v	W	med
<i>Araschnia levana</i> L., 1758	Landkärtchen		v		sib
<i>Argynnis paphia</i> L., 1758	Kaisermantel		v	W	sib
<i>Mesoacidalia aglaja</i> L., 1758	Großer Perlmutterfalter	A.4	+	s	H med
<i>Brenthis ino</i> ROTT., 1775	Feuchtwiesen- Perlmutterfalter	A.3	s	T	sib
<i>Clossiana selene</i> D. & S., 1775	Braunfleckiger Perlmutterfalter		+	s	T sib
<i>Mellicta athalia</i> ROTT., 1775	Wachtelweizen- Scheckenfalter	A.4	-		W sib
<i>Melanargia galathea</i> L., 1758	Schachbrett		v	H	kas
<i>Erebia medusa</i> D. & S., 1775	Rundaugen- Mohrenfalter	A.4	-		H sib
<i>Maniola jurtina</i> L., 1758	Großes Ochsenauge		h		pon
<i>Aphantopus hyperantus</i> L., 1758	Schornsteinfeger		h		sib
<i>Coenonympha pamphilus</i> L., 1758	Kleines Wiesen- vögelchen		v		med
<i>Coenonympha arcania</i> L., 1761	Weißbindiges Wiesenvögelchen		h	H	adr
<i>Pararge aegeria</i> L., 1758	Waldbrettspiel		h	W	pon
<i>Lasiommata megera</i> L., 1767	Mauerfuchs		v	H	med
<i>Lasiommata maera</i> L., 1758	Braunaug	A.4	s	X	med

Tab. 4.10/1(3)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement		
Fam.: Lycaenidae						
<i>Hamearis lucina</i> L., 1758	Brauner Würfelfalter	A.2	-		W	adr
<i>Callophrys rubi</i> L., 1758	Grüner Zipfelfalter			v	H	sib
<i>Thecla betulae</i> L., 1758	Nierenfleck- Zipfelfalter	A.3		v	H	sib
<i>Quercusia quercus</i> L., 1758	Eichen-Zipfelfalter	A.4	+	h	W	med
<i>Satyrrium acaciae</i> F., 1787	Kleiner Schlehen- Zipfelfalter	A.2		h	X *	pon
<i>Satyrrium w-album</i> KNOCH, 1782	Ulmen-Zipfelfalter	A.2		s	T	pon
<i>Fixsenia pruni</i> L., 1758	Pflaumen-Zipfelfalter	A.3		s	H	sib
<i>Lycaena phlaeas</i> L., 1761	Kleiner Feuerfalter		+	v	H	med
<i>Lycaena virgaureae</i> L., 1758	Dukaten-Feuerfalter	A.3		v	T	sib
<i>Lycaena tityrus</i> PODA, 1761	Brauner Feuerfalter	A.4		v	H	med
<i>Celastrina argiolus</i> L., 1758	Faulbaum-Bläuling	A.4		h	W	med
<i>Polyommatus icarus</i> ROTT., 1775	Hauhechel-Bläuling			v		med
Fam.: Lasiocampidae						
<i>Poecilocampa populi</i> L., 1758				v	W	sib
<i>Trichiura crataegi</i> L., 1758	Weißdorn-Spinner	A.4		v	H	med
<i>Malacosoma neustria</i> L., 1758	Ringel-Spinner			v		med
<i>Lasiocampa trifolii</i> D. & S., 1775	Klee-Spinner		+	s	H	med
<i>Lasiocampa quercus</i> L., 1758	Eichen-Spinner		+	v	H	sib
<i>Macrothylacia rubi</i> L., 1758	Brombeer-Spinner			v		sib
<i>Dendrolimus pini</i> L., 1758	Kiefern-Spinner		-		N	sib
<i>Philudoria potatoria</i> L., 1758	Gras-Glucke		+	s	T	sib
<i>Phyllodesma tremulifolia</i> HB., [1810]	Eichen-Glucke	A.3		v	H	sib
Fam.: Attacidae						
<i>Eudia pavonia</i> L., 1758	Kleines Nacht- pfauenauge			s	H	sib
<i>Aglia tau</i> L., 1758	Nagelfleck			v	W	atl
Fam.: Drepanidae						
<i>Falcaria lacertinaria</i> L., 1758	Echsen-Sichelflügler	A.4	+	s	T	sib
<i>Drepana binaria</i> HFN., 1767				h		med
<i>Drepana cultraria</i> F., 1775				h		med
<i>Drepana falcataria</i> L., 1758				v		sib
<i>Cilix glaucata</i> SCOP., 1763				v	H	med
Fam.: Thyatiridae						
<i>Thyatira batis</i> L., 1758	Rosen-Eule			h		sib
<i>Habrosyne pyritoides</i> HFN., 1766				h		sib
<i>Tethea ocularis</i> L., 1767	Schwarzgebänderter Wollrückenspinner	A.3	+	s	T	med
<i>Tethea</i> or D. & S., 1775				s		sib
<i>Tetheella fluctuosa</i> HB., [1803]			+	s	W	med
<i>Ochropacha duplaris</i> L., 1761				s		sib
<i>Cymatophorima diluta</i> D. & S., 1775				v		med
<i>Achlya flavicornis</i> L., 1758	Rosthörniger Wollbeinspinner	A.4	+	s	W	med

Tab. 4.10/1(4)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.	Neufunde		
<i>Polyplocia ridens</i> F., 1787	Moosgrüner Wollbeinspinner	A.3	s	W	med
Fam.: Geometridae					
<i>Archicaris notha</i> HB., [1803]	Pappei-Jungfernkind	A.3	+	s	T
<i>Alsophila aescularia</i> D. & S., 1775				h	med
<i>Alsophila quadripunctaria</i> ESP., 1800 (= <i>A. aceraria</i> D. & S.)			+	s	W
<i>Pseudoterpna pruinata</i> HFN., 1767				s	H
<i>Geometra papilionaria</i> L., 1758	Grünes Blatt			v	sib
<i>Comibaena bajularia</i> D. & S., 1775 (= <i>C. pustulata</i> HFN.)				s	W
<i>Hemitheia aestivaria</i> HB., [1799]				v	sib
<i>Thalera fimbrialis</i> SCOP., 1763			-		H
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> ESP., 1794				s	H
<i>Jodis lactearia</i> L., 1758	Glattgestreifter Heidelbeerspanner	A.3		s	W
<i>Jodis putata</i> L., 1758	Heidelbeerspanner	A.2	-		W
<i>Cyclophora annulata</i> SCHULZE, 1775				s	W
<i>Cyclophora albipunctata</i> HFN., 1767	Punktierter Weiden-Augenspanner	A.2	+	s	T
<i>Cyclophora ruficiliaria</i> H.-S., 1855	Braunroter Eichen- Gürtelpuppenspanner	A.3		v	W
<i>Cyclophora porata</i> L., 1767				v	med
<i>Cyclophora punctaria</i> L., 1758				h	med
<i>Cyclophora linearis</i> HB., [1799]				h	pon
<i>Timandra griseata</i> W. PET., 1902				v	med
<i>Scopula nigropunctata</i> HFN., 1767				v	sib
<i>Scopula ornata</i> SCOP., 1763			-		H
<i>Scopula marginipunctata</i> GZE, 1781				h	H
<i>Scopula floslactata</i> HW., 1809 (= <i>S. lactata</i> HW.)				v	sib
<i>Idaea muricata</i> HFN., 1767				s	T
<i>Idaea vulpinaria</i> H.-S., 1851	Braungebänderter Hecken-Kleinspanner	A.3		v	X *
<i>Idaea moniliata</i> D. & S., 1775	Perlrandiger Kleinspanner	A.2		s	X *
<i>Idaea biselata</i> HFN., 1767				h	sib
<i>Idaea dilutaria</i> HB., [1799]	Moos-Kleinspanner	A.3	+	s	X *
<i>Idaea fuscovenosa</i> GZE, 1781				s	H
<i>Idaea dimidiata</i> HFN., 1767				s	med
<i>Idaea subsericeata</i> HW., 1809	Olivgrauer Kleinspanner	A.4		v	H
<i>Idaea contiguaria</i> HB., [1799] (= <i>Sterrhia cburnata</i> WOCKE)	Bräunlicher Felsflur- Kleinspanner	A.2		s	X *
<i>Idaea aversata</i> L., 1758				h	med
<i>Idaea rubraria</i> STGR, 1871	Rötlichgelber Zwergspanner	A.3		s	X *
<i>Idaea straminata</i> BKH., 1794 (= <i>Sterrhia inornata</i> HW.)				v	W
<i>Idaea deversaria</i> H.-S., 1847	Strohgelber Kleinspanner	A.3		v	X
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> CL., 1759	Rotbandspanner	A.4		s	H

Tab. 4.10/1(5)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
<i>Scotopteryx moeniata</i> SCOP., 1763	Dunkelbraungebänderter Linienspanner	A.3	v	H	pon
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> L., 1758			h		sib
<i>Scotopteryx mucronata</i> SCOP., 1763			s		?
<i>Scotopteryx luridata</i> HFN., 1767 (= <i>S. plumbaria</i> F.)			-		?
<i>Orthonama vittata</i> BKH., 1794	Sumpflabkraut-Blattspanner	A.3	+ s	T	eur
<i>Xanthorhoe biriviata</i> BKH., 1794			s		sib
<i>Xanthorhoe designata</i> HFN., 1767			v		sib
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> D. & S., 1775			h		med
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> CL., 1759			v		med
<i>Xanthorhoe quadrifasiata</i> CL., 1759			v	W	sib
<i>Xanthorhoe montanata</i> D. & S., 1775			h		med
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> L., 1758			v		med
<i>Catarhoe rubidata</i> D. & S., 1775			v	H	pon
<i>Catarhoe cuculata</i> HFN., 1767			v	W	sib
<i>Epirrhoe tristata</i> L., 1758			v		sib
<i>Epirrhoe alternata</i> O. F. MÜLLER, 1764			h		med
<i>Epirrhoe rivata</i> HB., [1813]			v		med
<i>Epirrhoe molluginata</i> HB., [1813]			v	H	pon
<i>Epirrhoe galiata</i> D. & S., 1775			h	H	med
<i>Camptogramma bilineata</i> L., 1758			v	H	med
<i>Larentia clavaria</i> HW., 1809	Rehfarbiger Linienspanner	A.3	+ s	H	med
<i>Anticlea badiata</i> D. & S., 1775			h	H	pon
<i>Anticlea derivata</i> D. & S., 1775	Schwarzgebänderter Rosen-Blattspanner	A.3	s	H	pon
<i>Mesoleuca albicillata</i> L., 1758			v		sib
<i>Lampropteryx suffumata</i> D. & S., 1775			h	W	sib
<i>Cosmorhoe ocellata</i> L., 1758			h		med
<i>Nebula salicata</i> HB., 1799	BlaugrauerBlattspanner	A.2	s	X *	med
<i>Eulithis prunata</i> L., 1758			h	H	sib
<i>Eulithis populata</i> L., 1758			+ s	W	sib
<i>Eulithis mellinata</i> F., 1787			v		adr
<i>Eulithis pyraliata</i> D. & S., 1775			s		sib
<i>Ecliptopera silaceata</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Ecliptopera capitata</i> H.-S., 1839	Balsaminen-Blattspanner	A.3	+ v	W	sib
<i>Chloroclysta siterata</i> HFN., 1767	Olivgrüner Blattspanner	A.3	v	W	med
<i>Chloroclysta miata</i> L., 1758	Blaugrüner Heidelbeer-Blattspanner	A.3	s	W	med
<i>Chloroclysta citrata</i> L., 1761			+ h		sib
<i>Chloroclysta truncata</i> HFN., 1767			h		sib
<i>Cidaria fulvata</i> FORST., 1771			s	H	med
<i>Plemyria rubiginata</i> D. & S., 1775			s	T	sib
<i>Thera firmata</i> HB., [1822]			+ s		atl
<i>Thera obeliscata</i> HB., 1787			+ s		med
<i>Thera variata</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Thera britannica</i> TURNER, 1925 (= <i>T. albonigrata</i> GORNIK)			+ v		?

Tab. 4.10/1(6)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ Neufunde		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.			
<i>Thera stragulata</i> HB., [1809]	Verkannter Blattspanner	A.2	+	s	N ?
<i>Eustroma reticulatum</i> D. & S., 1775 (= <i>E. reticulata</i> D. & S.)	Weißgerippter Haarbuschspanner	A.3	+	s	W sib
<i>Electrophaes corylata</i> THNBG, 1792				v	sib
<i>Colostygia olivata</i> D. & S., 1775			+	h	W med
<i>Colostygia pectinataria</i> KNOCH, 1781				v	med
<i>Hydriomena furcata</i> THNBG, 1784				h	sib
<i>Hydriomena impluviata</i> D. & S., 1775 (= <i>H. coerulata</i> F.)				v	sib
<i>Horisme vitalbata</i> D. & S., 1775				s	H med
<i>Horisme tersata</i> D. & S., 1775				s	H sib
<i>Horisme radicularia</i> LAH, 1855			+	s	H ?
<i>Melanthia procellata</i> D. & S., 1775				v	H sib
<i>Pareulype berberata</i> D. & S., 1775				s	H med
<i>Spargania luctuata</i> D. & S., 1775			-		W sib
<i>Rheumaptera undulata</i> L., 1758			+	s	sib
<i>Triphosa dubitata</i> L., 1758				v	med
<i>Philereme vetulata</i> D. & S., 1775	Grauer Heckenspanner	A.3		s	H sib
<i>Philereme transversata</i> HFN., 1767	Brauner Heckenspanner	A.3		h	H sib
<i>Euphya biangulata</i> HW., 1809 (= <i>E. picata</i> HB.)	Nelken-Blattspanner	A.3		s	H sib
<i>Epirrita dilutata</i> D. & S., 1775			+	s	sib
<i>Epirrita christyi</i> ALLEN, 1906	Kleiner Herbstspanner	A.4	+	h	W ?
<i>Operophtera brumata</i> L., 1758	Kleiner Frostspanner			h	sib
<i>Operophtera fagata</i> SCHRFBG, 1805			+	h	sib ?
<i>Perizoma alchemillata</i> L., 1758				h	med
<i>Perizoma hydrata</i> TR., 1829	Leimkraut- Kapselspanner	A.2		s	H * med
<i>Perizoma albulata</i> D. & S., 1775			+	s	med
<i>Perizoma flavofasciata</i> THNBG, 1792	Kiesflur-Lichtnelken- Kapselspanner	A.4	+	s	H med
<i>Eupithecia tenuiata</i> HB., [1813]				s	pon
<i>Eupithecia inturbata</i> HB., [1817]	Feldahorn-Blüten- spanner	A.2	+	s	H ?
<i>Eupithecia haworthiata</i> DBLD., 1856				s	H sib
<i>Eupithecia plumbeolata</i> HW., 1809	Wachtelweizen- Blütenspanner	A.4		s	H sib
<i>Eupithecia abietaria</i> GZE, 1781 (= <i>E. pini</i> RETZIUS)			+	s	N sib
<i>Eupithecia bilunulata</i> ZETT., [1839]			+	s	N sib
<i>Eupithecia linariata</i> D. & S., 1775				s	med
<i>Eupithecia pulchellata</i> STPH., 1831			+	s	W atl
<i>Eupithecia exigua</i> HB., [1813]	Laubgehölz-Bergwald- Blütenspanner	A.3		s	H atl
<i>Eupithecia insigniata</i> HB., 1790	Obsthain-Blütenspanner	A.3		s	H med
<i>Eupithecia venosata</i> F., 1787				s	H med
<i>Eupithecia egenaria</i> H.-S., 1848	Linden-Blütenspanner	A.2	+	s	W ?
<i>Eupithecia centaureata</i> D. & S., 1775				v	med
<i>Eupithecia satyrata</i> HB., [1813]				s	T med
<i>Eupithecia absinthiata</i> CL., 1759				v	med
<i>Eupithecia expallidata</i> DBLD., 1856	Goldruten- Blütenspanner	A.3	+	s	W eur
<i>Eupithecia assimilata</i> DBLD., 1856				s	med

Tab. 4.10/1(7)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/		Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.	Neufunde		
<i>Eupithecia vulgata</i> HW., 1809			v		med
<i>Eupithecia tripunctaria</i> H.-S., 1852			+	v	sib
<i>Eupithecia denotata</i> HB., [1813]	Glockenblumen- Blütenspanner	A.3	+	s	W med
<i>Eupithecia subfuscata</i> HW., 1809 (= <i>E. castigata</i> HB.)				h	med
<i>Eupithecia icterata</i> VILL., 1789				v	med
<i>Eupithecia succenturiata</i> L., 1758				v	sib
<i>Eupithecia subumbrata</i> D. & S., 1775			+	s	med
<i>Eupithecia semigraphata</i> BRD., [1851]	Feldthymian- Blütenspanner	A.3		s	X med
<i>Eupithecia indigata</i> HB., [1813]			+	s	N med
<i>Eupithecia pimpinellata</i> HB., [1813]			-		med
<i>Eupithecia virgaureata</i> DBLD., 1861	Rötlichgrauer Gold- ruten-Blütenspanner	A.3	+	s	H sib
<i>Eupithecia abbreviata</i> STPH., 1831				h	W med
<i>Eupithecia dodoneata</i> GN., 1857	Kleiner Eichen- Blütenspanner	A.3	-		W med
<i>Eupithecia lanceata</i> HB., [1825]				v	adr
<i>Eupithecia lariciata</i> FREYER, 1842			+	s	med
<i>Eupithecia tantillaria</i> BSDV., 1840				h	med
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> HW., 1809 (= <i>G. pumilata</i> HB.)				s	med
<i>Chloroclystis v-ata</i> HW., 1809				v	sib
<i>Chloroclystis chloerata</i> MAB., 1870	Schlehen-Blütenspanner	A.3	-		H sib
<i>Chloroclystis rectangulata</i> L., 1758				h	med
<i>Chloroclystis debiliata</i> HB., [1817]	Grüner Heidelbeer- Blütenspanner	A.3	+	s	W sib
<i>Chesias legatella</i> D. & S., 1775				s	atl
<i>Chesias rufata</i> F., 1775				s	H med
<i>Aplocera plagiata</i> L., 1758				v	med
<i>Aplocera efformata</i> GN., 1857			+	s	med
<i>Aplocera praeformata</i> HB., [1826]	Olivgrauer Kurzbeinspanner	A.3	+	s	W med
<i>Euchoeca nebulata</i> SCOP., 1763				s	T sib
<i>Asthena albulata</i> HFN., 1767				h	sib
<i>Hydrelia flammeolaria</i> HFN., 1767				s	T sib
<i>Hydrelia sylvata</i> D. & S., 1775 (= <i>H. testacea</i> DONZEL)			+	s	T sib
<i>Minoa murinata</i> SCOP., 1763				v	H med
<i>Lobophora halterata</i> HFN., 1767				s	sib
<i>Trichopteryx carpinata</i> BKH., 1794				s	sib
<i>Acasis viretata</i> HB., [1799]	Grünlicher Gebüsch- Lappenspanner	A.4	+	s	W sib
<i>Abraxas grossulariata</i> L., 1758	Stachelbeerspanner	A.4		v	H sib
<i>Abraxas sylvata</i> SCOP., 1763	Traubenkirschen- Harlekin	A.3	-		W sib
<i>Lomaspilis marginata</i> L., 1758				h	sib
<i>Ligdia adustata</i> D. & S., 1775				h	H pon
<i>Semiothisa notata</i> L., 1758				s	sib
<i>Semiothisa alternaria</i> HB., [1809]				v	sib
<i>Semiothisa signaria</i> HB., [1809]				v	sib
<i>Semiothisa liturata</i> CL., 1759				h	N sib

Tab. 4.10/1(8)

Familie Art	Deutscher Name	R.L.	Häufigkeit/ Neufunde	Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement
<i>Semiothisa clathrata</i> L., 1758			v	med
<i>Isturgia limbaria</i> F., 1775			s	H pon
<i>Itame wauaria</i> L., 1758			v	sib
<i>Itame brunneata</i> THNBG, 1784 (= <i>I. fulvaria</i> VILL.)			-	W sib
<i>Petrophora chlorosata</i> SCOP., 1763			+	s sib
<i>Plagodis pulveraria</i> L., 1758			v	W sib
<i>Plagodis dolabraria</i> L., 1767			s	sib
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> HB., [1799]	Heidekraut- Kugelstirnspanner	A.4	s	H atl
<i>Opisthograptis luteolata</i> L., 1758			h	med
<i>Pseudopanthera macularia</i> L., 1758			h	med
<i>Apeira syringaria</i> L., 1758	Fliederspanner	A.2	+	s H sib
<i>Ennomos quercinaria</i> HFN., 1767			s	pon
<i>Ennomos alniaria</i> L., 1758			s	med
<i>Ennomos fuscantaria</i> STH., 1809			+	s atl
<i>Ennomos erosaria</i> D. & S., 1775			v	med
<i>Selenia dentaria</i> F., 1775 (= <i>S. bilunaria</i> ESP.)			h	sib
<i>Selenia lunularia</i> HB., 1788 (= <i>S. lunaria</i> D. & S.)			s	W med
<i>Selenia tetralunaria</i> HFN., 1767			v	sib
<i>Odontopera bidentata</i> CL., 1759			v	sib
<i>Crocallis elinguaris</i> L., 1758			+	v med
<i>Ourapteryx sambucaria</i> L., 1758	Holunderspanner		v	sib
<i>Colotois pennaria</i> L., 1761			h	med
<i>Angerona prunaria</i> L., 1758			v	W sib
<i>Apocheima hispidaria</i> D. & S., 1775			+	s sib
<i>Apocheima pilosaria</i> D. & S., 1775 (= <i>A. pedaria</i> F.)	Schneespanner		s	sib
<i>Lycia hirtaria</i> CL., 1759	Braunbindiger Spinnerspanner	A.4	+	s H pon
<i>Biston strataria</i> HFN., 1767			h	med
<i>Biston betularia</i> L., 1758	Birkenspanner		v	med
<i>Agriopis leucophaearia</i> D. & S., 1775			h	sib
<i>Agriopis bajaria</i> D. & S., 1775			v	H pon
<i>Agriopis aurantiaria</i> HB., [1799]			v	pon
<i>Agriopis marginaria</i> F., 1777			h	pon
<i>Erannis defoliaria</i> CL., 1759	Großer Frostspanner		+	v kas
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> D. & S., 1775			h	med
<i>Peribatodes secundaria</i> ESP., 1794			h	pon
<i>Cleora cinctaria</i> D. & S., 1775	Ringfleck-Baumspanner	A.4	-	H sib
<i>Deileptenia ribeata</i> CL., 1759	Tannen-Baumspanner	A.4	+	s N sib
<i>Alcis repandata</i> L., 1758			h	sib
<i>Alcis maculata</i> ssp. <i>bastelbergeri</i> HIRSCH., 1908			h	W sib
<i>Boarmia roboraria</i> D. & S., 1775	Steineichen- Baumspanner	A.4	v	W sib
<i>Serraca punctinalis</i> SCOP., 1763			v	med
<i>Ectropis bistortata</i> GZE, 1781			v	sib
<i>Ectropis consonaria</i> HB., [1799]			s	W sib
<i>Ectropis extersaria</i> HB., [1799]			h	sib
<i>Ematurga atomaria</i> L., 1758			v	med

Tab. 4.10/1(9)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde		Biotoptpräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
<i>Bupalus piniaria</i> L., 1758	Kiefern-Spanner		s	N	med
<i>Cabera pusaria</i> L., 1758			v		med
<i>Cabera exanthemata</i> SCOP., 1763			v		med
<i>Lomographa bimaculata</i> F., 1775			s		sib
<i>Lomographa temerata</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Aleucis distinctata</i> H.-S., 1839	Schlehenhecken- Grauspanner	A.3	v	H	med
<i>Theria rupicaprararia</i> D. & S., 1775			v	H	kas
<i>Theria primaria</i> HW., 1809			s	H	?
<i>Campaea margaritata</i> L., 1767			h		med
<i>Campaea honoraria</i> D. & S., 1775	Rötlichbrauner Eichenspanner	A.3	s	W	atl
<i>Hylaea fasciaria</i> L., 1758			v		sib
<i>Puengeleria capreolaria</i> D. & S., 1775	Tannen-Staubband- spanner	A.4	+ s	N	adr
<i>Gnophos furvatus</i> D. & S., 1775	Aschgrauer Steinspanner	A.3	s	X *	med
<i>Gnophos obscuratus</i> D. & S., 1775			+ v	H	med
<i>Gnophos pullatus</i> D. & S., 1775	Blaugrauer Felsen- Steinspanner	A.2	s	X *	med
<i>Siona lineata</i> SCOP., 1763			h	H	med
<i>Perconia strigillaria</i> HB., 1787			s		pon
Fam.: Sphingidae					
<i>Sphinx ligustri</i> L., 1758	Liguster-Schwärmer		-	H	med
<i>Hyloicus pinastri</i> L., 1758	Kiefern-Schwärmer		s	N	sib
<i>Mimas tiliae</i> L., 1758	Linden-Schwärmer		s		sib
<i>Smerinthus ocellata</i> L., 1758	Abendpfauenauge		s		sib
<i>Laothoe populi</i> L., 1758	Pappelschwärmer		v		sib
<i>Proserpinus proserpina</i> PALL., 1772	Nachtkerzen- Schwärmer	A.2	-	H	med
<i>Deilephila elpenor</i> L., 1758	Mittlerer Weinschwärmer		v		sib
<i>Deilephila porcellus</i> L., 1758	Kleiner Weinschwärmer		v	H	sib
Fam.: Notodontidae					
<i>Phalera bucephala</i> L., 1758	Mondfleck		v		sib
<i>Cerura vinula</i> L., 1758	Großer Gabelschwanz		s		sib
<i>Furcula furcula</i> CL., 1759			v		med
<i>Stauropus fagi</i> L., 1758	Buchenspinner		v	W	med
<i>Peridea anceps</i> GZE, 1781			v		med
<i>Notodonta dromedarius</i> L., 1767			v		sib
<i>Notodonta torva</i> HB., [1803]	Weichholzauen- Zahns spinner	A.3	+ s	W	sib
<i>Drymonia dodonaea</i> D. & S., 1775 (= <i>D. trimacula</i> ESP.)			h	W	med
<i>Drymonia ruficornis</i> HFN., 1766			h	W	med
<i>Drymonia melagona</i> BKH., 1790			s	W	atl
<i>Tritophia tritophus</i> D. & S., 1775 (= <i>Notodonta phoebe</i> SIEBERT)	Espen-Zickzackspinner	A.2	s	T	med
<i>Harpypia milhauseri</i> F., 1775	Pergamentspinner	A.4	s	W	med
<i>Pheosia gnoma</i> F., 1777			v		sib
<i>Pheosia tremula</i> CL., 1759	Porzellanspinner		s		sib

Tab. 4.10/1(10)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde			Biotopräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.				
<i>Ptilophora plumigera</i> D. & S., 1775	Haarschuppenspinner	A.3	+	v	H	med
<i>Pterostoma palpina</i> CL., 1759				v		sib
<i>Ptilodon capucina</i> L., 1758 (= <i>Lophopteryx camelina</i> L.)	Kamelspinner			h		sib
<i>Ptilodontella cucullina</i> D. & S., 1775 (= <i>Lophopteryx cuculla</i> ESP.)	Ahorn-Zahns spinner	A.4		s	W	med
<i>Leucodonta bicoloria</i> D. & S., 1775	Weißer Zahns spinner	A.3	+	s	W	sib
<i>Eligmodonta ziczac</i> L., 1758				v		atl
<i>Odontosia carmelita</i> ESP., 1799	Karmeliterspinner	A.4		s	W	atl
<i>Gluphisia crenata</i> ESP., 1785	Dunkelgrauer Wellenrandspinner	A.4	+	s	W	med
<i>Clostera curtula</i> L., 1758	Erpelschwanz	A.4		s	H	sib
<i>Clostera pigra</i> HFN., 1766				s		med
Fam.: Dilobidae						
<i>Diloba caeruleocephala</i> L., 1758				h	H	med
Fam.: Lymantriidae						
<i>Orgyia recens</i> HB., 1819				+	v	sib
<i>Elkneria pudibunda</i> L., 1758	Streckfuß			h	W	sib
<i>Euproctis similis</i> FUESSLY, 1775	Schwan			v		med
<i>Leucoma salicis</i> L., 1758	Pappel-Spinner			s	T	sib
<i>Arctornis l-nigrum</i> O. F. MÜLLER 1764				s	W	med
<i>Lymantria monacha</i> L., 1758	Nonne			h	N	sib
<i>Lymantria dispar</i> L., 1758	Schwammspinner			s		sib
Fam.: Arctiidae						
<i>Thumatha senex</i> HB., [1808]	Seggen-Flechtenspinner	A.2	+	s	T	sib
<i>Miltochrista miniata</i> FORST., 1771				s	W	med
<i>Nudaria mundana</i> L., 1761	Blankflügel	A.2		s	X	med
<i>Atolmis rubricollis</i> L., 1758	Rothals-Flechtenspinner	A.3		v	N	sib
<i>Cybosia mesomella</i> L., 1758				s		sib
<i>Eilema sororcula</i> HFN., 1766				v		med
<i>Eilema caniola</i> HB., [1808]	Gelbsaum- Flechtenspinner	A.2	-		X *	?
<i>Eilema complana</i> L., 1758				h		sib
<i>Eilema lurideola</i> ZCK., 1817				h		med
<i>Eilema deplana</i> ESP., 1787 (= <i>E. depressa</i> ESP.)				h		sib
<i>Lithosia quadra</i> L., 1758	Würfelmotte	A.3	-		W	sib
<i>Arctia caja</i> L., 1758	Brauner Bär			v		sib
<i>Arctia villica</i> L., 1758	Schwarzer Bär	A.2		s	X	med
<i>Diacrisia sannio</i> L., 1758			+	s	H	sib
<i>Spilosoma lubricipeda</i> L., 1758 (= <i>S. menthastris</i> D. & S.)				v		sib
<i>Spilosoma luteum</i> HFN., 1766 (= <i>S. lubricipeda</i> auct.)				s		sib
<i>Diaphora mendica</i> CL., 1759				v		sib
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> L., 1758	Rostbär			v		sib
<i>Callimorpha quadripunctaria</i> PODA, 1761	Russischer Bär			h	H	med

Tab. 4.10/1(11)

Familie Art	Deutscher Name	R.L.	Häufigkeit/ Neufunde	Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
<i>Callimorpha dominula</i> L., 1758	Schönbär		s	W	med
<i>Tyria jacobaeae</i> L., 1758	Jakobskrautbär		s		sib
Fam.: Ctenuchidae					
<i>Dysauxes ancilla</i> L., 1767	Braunes Fleckwidderchen	A.3	h	X *	med
Fam.: Nolidae					
<i>Meganola strigula</i> D. & S., 1775	Kleiner Eichenbär	A.3	v	W	med
<i>Meganola albula</i> D. & S., 1775			s	H	med
<i>Nola cucullatella</i> L., 1758			s	H	med
<i>Nola confusalis</i> H.-S., 1847			v	W	sib
Fam.: Noctuidae					
<i>Euxoa tritici</i> L., 1761	Weizeneule		+ s		med
<i>Euxoa nigricans</i> L., 1761	Violettschwarze Erdeule	A.3	+ v	H	med
<i>Agrotis segetum</i> D. & S., 1775			v		med
<i>Agrotis clavus</i> HFN., 1766	Rindengraue Erdeule	A.3	+ s	H	sib
<i>Agrotis exclamationis</i> L., 1758	Gemeine Graseule		h		med
<i>Agrotis ipsilon</i> HFN., 1766			h		M med
<i>Ochropleura plecta</i> L., 1761			h		med
<i>Chersotis multangula</i> HB., [1803]	Vielwinkelige Erdeule	A.3	v	X *	med
<i>Noctua pronuba</i> L., 1758	Hausmutter		h		med
<i>Noctua comes</i> HB., [1813]			v		med
<i>Noctua fimbriata</i> SCHREBER, 1759	Gelbe Bandeule		v		med
<i>Noctua cf. janthina</i> D. & S., 1775			h		med
<i>Noctua interjecta</i> HB., [1803]	Hellgraue Bandeule	A.3	v	H	adr
<i>Epilecta linogrisea</i> D. & S., 1775	Silbergraue Bandeule	A.3	+ s	X *	med
<i>Opigena polygona</i> D. & S., 1775	Haarstirnige Heideeule	A.3	+ s	H	pon
<i>Graphiphora augur</i> F., 1775			s		sib
<i>Paradiarsia glareosa</i> ESP., 1788	Aschgraue Habichtskraut-Erdeule	A.3	v	H	atl
<i>Lycophotia porphyrea</i> D. & S., 1775			s		adr ?
<i>Diarsia mendica</i> F., 1775			v	W	sib
<i>Diarsia brunnea</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Diarsia rubi</i> VIEWEG, 1790			s		sib
<i>Xestia c-nigrum</i> L., 1758			v		med
<i>Xestia ditrapezium</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Xestia triangulum</i> HFN., 1766			v		pon
<i>Xestia baja</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Xestia rhomboidea</i> ESP., 1790	Violettbraune Erdeule	A.4	h	W	adr
<i>Xestia sexstrigata</i> HW., 1809	Gelbbraune Quecken-Erdeule	A.4	+ s	T	adr
<i>Xestia xanthographa</i> D. & S., 1775			h		med
<i>Naenia typica</i> L., 1758	Adereule	A.3	+ s	T	sib
<i>Anaplectoides prasina</i> D. & S., 1775			v		sib
<i>Cerastis rubricosa</i> D. & S., 1775			v		pon
<i>Cerastis leucographa</i> D. & S., 1775	Graubraune Wegerich-Eule	A.3	s	W	sib
<i>Discestra trifolii</i> HFN., 1766			s		med
<i>Hada nana</i> HFN., 1766			-		med
<i>Polia bombycina</i> HFN., 1766	Hauhechel-Garteneule	A.4	+ s	W	sib

Tab. 4.10/1(12)

Familie Art	Deutscher Name	R.L.	Häufigkeit/ Neufunde	Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
<i>Polia nebulosa</i> HFN., 1766			h		sib
<i>Pachetra sagittigera</i> HFN., 1766			h		med
<i>Heliophobus reticulata</i> GZE, 1781	HellgerippteGarteneule	A.4	s	H	pon
<i>Mamestra brassicae</i> L., 1758	Kohl-Eule		s		med
<i>Mamestra persicariae</i> L., 1761			v		sib
<i>Mamestra contigua</i> D. & S., 1775			s		sib
<i>Mamestra w-latinum</i> HFN., 1766			s	H	sib
<i>Mamestra thalassina</i> HFN., 1766			v		sib
<i>Mamestra suasa</i> D. & S., 1775			v		sib
<i>Mamestra oleracea</i> L., 1758	Gemüse-Eule		s		med
<i>Mamestra pisi</i> L., 1758	Erbsen-Eule		v		sib
<i>Mamestra bicolorata</i> HFN., 1766			+		med
<i>Mamestra dysodea</i> D. & S., 1775			-	H	med
<i>Hadena rivularis</i> F., 1775	Violettbraune Kapseleule	A.4	s	H	med
<i>Hadena perplexa</i> D. & S., 1775 (= <i>H. lepida</i> ESP.)	Leimkraut-Kapseleule	A.3	s	H	med
<i>Hadena compta</i> D. & S., 1775			s		med
<i>Hadena confusa</i> HFN., 1766	Kleine Nelkeneule	A.3	s	H	med
<i>Hadena bicurris</i> HFN., 1766			+		med
<i>Cerapteryx graminis</i> L., 1758	Graseule		v		sib
<i>Tholera decimalis</i> PODA, 1761			-		med
<i>Panolis flammea</i> D. & S., 1775	Kieferneule		s	N	sib
<i>Egira conspicularis</i> L., 1758			v	H	pon
<i>Orthosia cruda</i> D. & S., 1775			h		med
<i>Orthosia opima</i> HB., [1809]	Moorheiden- Frühlingseule	A.2	-	H	sib ?
<i>Orthosia populeti</i> F., 1781 (= <i>O. populi</i> STRÖM)	Pappel-Frühlingseule	A.3	+	W	sib
<i>Orthosia gracilis</i> D. & S., 1775	Hellgraue Frühlingseule	A.4	s	H	sib
<i>Orthosia stabilis</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Orthosia incerta</i> HFN., 1766			h		sib
<i>Orthosia munda</i> D. & S., 1775			h		sib
<i>Orthosia gothica</i> L., 1758			h		sib
<i>Mythimna conigera</i> D. & S., 1775			s		sib
<i>Mythimna ferrago</i> F., 1787			h	H	med
<i>Mythimna albipuncta</i> D. & S., 1775	Weißfleckige Schilf- graseule	I	v	M	med
<i>Mythimna impura</i> HB., [1808]			h		sib
<i>Mythimna pallens</i> L., 1758			s		sib
<i>Mythimna l-album</i> L., 1767			s	M	med
<i>Mythimna scirpi</i> DUP., 1836	Kleine Schilfrohreule	A.3	v	H	med
<i>Leucania comma</i> L., 1761	Kommaeule	A.3	s	T	sib
<i>Cucullia absinthii</i> L., 1761	Wermuthmönch	A.3	+	H	sib
<i>Cucullia chamomillae</i> D. & S., 1775	Kamillenmönch	A.3	+	H	med
<i>Cucullia umbratica</i> L., 1758			v		pon
<i>Cucullia xeranthemi</i> BSDV., 1840	Spreublumenmönch	A.2	s	X	* kas
<i>Cucullia asteris</i> D. & S., 1775	Astern-Braunmönch	A.3	+	H	sib
<i>Cucullia scrophulariae</i> D. & S., 1775			+		sib
<i>Cucullia verbasci</i> L., 1758			+		med
<i>Calophasia lunula</i> HFN., 1766			s		med
<i>Brachylochia viminalis</i> F., 1777			h		sib
<i>Brachionycha sphinx</i> HFN., 1766			+		pon

Tab. 4.10/1(13)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde			Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.	Neufunde			
<i>Lithophane socia</i> HFN., 1766	Gelbbraune Rindeneule	A.3	+	s	W	sib
<i>Lithophane ornitopus</i> HFN., 1766				v	W	sib
<i>Xylocampa areola</i> ESP., 1789				v		med
<i>Allophyes oxycanthae</i> L., 1758				h		med
<i>Valeria oleagina</i> D. & S., 1775	Olivgrüne Schmuckeule	A.2	+	v	H *	med
<i>Dichonia aprilina</i> L., 1758	Grüne Eicheneule		+	s	W	med
<i>Blepharita satura</i> D. & S., 1775				v		sib
<i>Polymixis xanthomista</i> HB., [1819]	Blaugraue Steineule	A.3		s	W	atl
<i>Antitype chi</i> L., 1758	Saudistel-Steineule	A.3	+	s	W	sib
<i>Ammoconia caecimacula</i> D. & S., 1775				s	H	pon
<i>Eupsilia transversa</i> HFN., 1766				h		sib
<i>Conistra vaccinii</i> L., 1761				h		sib
<i>Conistra rubiginosa</i> SCOP., 1763				s	H	atl
<i>Conistra rubiginea</i> D. & S., 1775				s	H	sib
<i>Agrochola cellaris</i> HFN., 1766			+	h		sib
<i>Agrochola lota</i> CL., 1759				s		med
<i>Agrochola macilentata</i> HB., [1809]				h		med
<i>Agrochola helvola</i> L., 1758				v		med
<i>Omphaloscelis lunosa</i> HW., 1809	Westliche Woll- schenkeule	A.4	+	v	H	atl
<i>Xanthia aurago</i> D. & S., 1775				h	W	adr
<i>Xanthia togata</i> ESP., 1788			+	s		sib
<i>Xanthia icteritia</i> HFN., 1766				h		sib
<i>Xanthia citrigo</i> L., 1758	Linden-Goldeule	A.3	+	s	W	pon
<i>Colocasia coryli</i> L., 1758				h		sib
<i>Moma alpium</i> OSBECK 1778	Seladoneule			s	W	sib
<i>Acronicta megacephala</i> D. & S., 1775			+	s		med
<i>Acronicta alni</i> L., 1767				s	W	sib
<i>Acronicta psi</i> L., 1758				v		med
<i>Acronicta aceris</i> L., 1758	Ahorneule			s		med
<i>Acronicta leporina</i> L., 1758				s		sib
<i>Acronicta auricoma</i> D. & S., 1775				v		sib
<i>Acronicta rumicis</i> L., 1758	Ampfereule		+	s		med
<i>Craniophora ligustri</i> D. & S., 1775				+	v	H
<i>Cryphia algae</i> F., 1775				+	v	H
<i>Cryphia ravula</i> HB., [1813]	Wandflechten- Algeneule	A.3		s	X *	med
<i>Cryphia domestica</i> HFN., 1766	Weißliche Algeneule	A.4		s	X	med
<i>Amphipyra pyramidea</i> L., 1758	Pyramideneule			h		med
<i>Amphipyra berbera</i> ssp. <i>svenssoni</i> FLETCH., 1968	Übersehene Pyramideneule	A.4	-		W	?
<i>Amphipyra tragopoginis</i> CL., 1759				v		med
<i>Mormo maura</i> L., 1758	Schwarzes Ordensband	A.4	-		T	pon
<i>Dypterygia scabriuscula</i> L., 1758				s		sib
<i>Rusina ferruginea</i> ESP., [1785]				h		pon
<i>Thalpophila matura</i> HFN., 1766				-		pon
<i>Trachea atriplicis</i> L., 1758	Meldeneule		+	s		med
<i>Euplexia lucipara</i> L., 1758				h		sib
<i>Phlogophora meticulosa</i> L., 1758	Achateule			v		med
<i>Phlogophora scita</i> HB., 1790	Waldfarn-Smaragdeule	A.2	+	s	W	pon
<i>Ipimorpha retusa</i> L., 1761	Weiden-Blatteule	A.3		s	T	sib
<i>Ipimorpha subtusa</i> D. & S., 1775	Pappel-Blatteule	A.3		v	W	sib

Tab. 4.10/1(14)

Familie Art	Deutscher Name	Häufigkeit/ R.L. Neufunde			Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement	
		R.L.	Neufunde			
<i>Enargia paleacea</i> ESP., 1788	Bräunlichgelbe Blatteule	A.4	+	s	W	sib
<i>Dyschorista ypsilon</i> D. & S., 1775 (= <i>Enargia ipsilon</i> D. & S.)	Weiden-Flachkopfeule	A.4		s	T	sib
<i>Cosmia trapezina</i> L., 1758				h		med
<i>Cosmia pyralina</i> D. & S., 1775				v		sib
<i>Actinotia polyodon</i> CL., 1759				s		sib
<i>Actinotia hyperici</i> D. & S., 1775	Weißgraue Johanniskrauteule	A.2	-		X	med
<i>Apamea monoglypha</i> HFN., 1766				h		med
<i>Apamea lithoxylaea</i> D. & S., 1775				v		pon
<i>Apamea crenata</i> HFN., 1766				v		sib
<i>Apamea epomidion</i> HW., 1809 (= <i>A. charactera</i> HB.)	Gelbbraune Graseule	A.2	+	s	W	sib
<i>Apamea lateritia</i> HFN., 1766	Rötlichbraune Graseule	A.4	+	s	W	sib
<i>Apamea remissa</i> HB., [1809]	Graubräunliche Graseule	A.4		v	W	sib
<i>Apamea unanimitas</i> HB., [1813]	Dunkelbräunlichgraue Graseule	A.4		s	T	sib
<i>Apamea illyria</i> FREYER, 1852	Gras-Erdeule	A.4	-		W	adr
<i>Apamea anceps</i> D. & S., 1775				v		sib
<i>Apamea sordens</i> HFN., 1766				v		sib
<i>Apamea scolopacina</i> ESP., 1788				s	W	sib
<i>Apamea ophiogramma</i> ESP., 1793	Gelbgraue Graseule	A.4		s	T	sib
<i>Oligia strigilis</i> L., 1758				h		med
<i>Oligia versicolor</i> BKH., 1792				s		atl ?
<i>Oligia latruncula</i> D. & S., 1775				h		med
<i>Oligia fasciuncula</i> HW., 1809	Gelbliches Graseulchen	A.3		v	H	atl
<i>Mesoligia furuncula</i> D. & S., 1775				h		sib
<i>Mesoligia literosa</i> HW., 1809	Rötlichgraue Graseule	A.3		s	H	med
<i>Mesapamea secalis</i> L., 1758				v		med
<i>Mesapamea didyma</i> ESP., 1788			+	h		?
<i>Photodes minima</i> HW., 1809	Schmieleneule	A.4		s	T	euras
<i>Luperina testacea</i> D. & S., 1775			+	s		pon
<i>Amphipoea fucosa</i> FREYER, 1830			+	s		sib
<i>Hydraecia micacca</i> ESP., 1789				s	T	sib
<i>Gortyna flavago</i> D. & S., 1775	Gemeine Markeule	A.4	+	s	T	kas
<i>Charanyca trigrammica</i> HFN., 1766				h		pon
<i>Hoplodrina alsines</i> BRAHM, 1791				h		sib
<i>Hoplodrina blanda</i> D. & S., 1775	Violettbraune Bodeneule	A.4		v	H	pon
<i>Hoplodrina superstes</i> O., 1816	Gelbgraue Bodeneule	A.3	-		X *	med
<i>Hoplodrina respersa</i> D. & S., 1775	Hellgraue Bodeneule	A.4		v	H	pon
<i>Hoplodrina ambigua</i> D. & S., 1775				s		med
<i>Caradrina morpheus</i> HFN., 1766	Salat-Bodeneule	A.4		v	H	sib
<i>Athetis pallustris</i> HB., [1808]	Graue Sumpfeule	A.2	-		T	sib
<i>Elaphria venustula</i> HB., 1790	Braune Grasmotteneule	A.4		v	H	sib
<i>Panemeria tenebrata</i> SCOP., 1763			+	s		med
<i>Pyrrhia umbra</i> HFN., 1766			-		H	sib
<i>Axylia putris</i> L., 1761				h		sib
<i>Lithacodia pygarga</i> HFN., 1766				h		sib
<i>Lithacodia deceptor</i> SCOP., 1763				v		sib
<i>Deltotes bankiana</i> F., 1775 (= <i>Eustrotia olivana</i> D. & S.)	Reitgras-Silbereulchen	A.4	-		T	sib

Tab. 4.10/1(15)

Familie Art	Deutscher Name	R.L.	Häufigkeit/ Neufunde	Biotoppräferenz/ Verbreitung/ Faunenelement
<i>Nycteola revayana</i> SCOP., 1772			s	med
<i>Earias clorana</i> L., 1761 (= <i>E. chlorana</i> L.)	Weiden- Grünspinnerchen	A.3	+ s	T sib
<i>Bena prasinana</i> L., 1758 (= <i>Pseudoips bicolorana</i> FUESSLY)	Eichen- Kahnspinnereule	A.4	v	W sib
<i>Pseudoips fagana</i> F., 1781 (= <i>Bena prasinana</i> L.)			v	sib
<i>Abrostola triplasia</i> L., 1758			h	sib
<i>Abrostola trigemina</i> WERNEBURG, 1864			s	med
<i>Polychrysis moneta</i> F., 1787	Eisenhut-Goldeule	A.3	-	T sib
<i>Diachrysis chrysitis</i> L., 1758			v	sib
<i>Macdunnoughia confusa</i> STPH., 1850			s	M med
<i>Plusia festucae</i> L., 1758			+ s	H sib
<i>Autographa gamma</i> L., 1758	Gammaeule		h	M med
<i>Autographa pulchrina</i> HW., 1809			h	sib
<i>Autographa jota</i> L., 1758	Goldenes V	A.3	+ s	W sib
<i>Autographa bractea</i> D. & S., 1775	Braune Silberfleck- Höckereule	A.4	s	W sib
<i>Catocala sponsa</i> L., 1767	Eichenkarmin	A.3	+ s	W med
<i>Catocala nupta</i> L., 1767	Rotes Ordensband	A.4	+ s	W sib
<i>Catocala promissa</i> D. & S., 1775	Kleiner Eichenkarmin	A.3	-	W med
<i>Minucia lunaris</i> D. & S., 1775	Braunes Ordensband	A.4	s	W med
<i>Callistege mi</i> CL., 1759			+ h	med
<i>Euclidia glyphica</i> L., 1758			+ h	med
<i>Tyta luctuosa</i> D. & S., 1775			-	X med
<i>Lygephila pastinum</i> TR., 1826			+ s	med
<i>Lygephila cracca</i> D. & S., 1775	Olivgraue Wickeneule	A.3	+ s	X med
<i>Scoliopteryx libatrix</i> L., 1758	Zackeneule		s	sib
<i>Laspeyria flexula</i> D. & S., 1775			v	sib
<i>Colobochyla salicalis</i> D. & S., 1775	Rotbraungestreifte Weiden-Spannereule	A.4	-	T sib
<i>Parascotia fuliginaria</i> L., 1761	Schwärzliche Schwamm-Spannereule	A.4	s	W pon
<i>Rivula sericealis</i> SCOP., 1763			h	med
<i>Herminia tarsipennalis</i> TR., 1835	Hellolivbraune Spannereule	A.4	v	H sib
<i>Herminia lunalis</i> SCOP., 1763	Felsbuschwald- Zünslereule	A.3	s	X sib
<i>Herminia tarsicrinalis</i> KNOCH, 1782			h	sib
<i>Herminia nemoralis</i> F., 1775 (= <i>Zanclognatha grisealis</i> D. & S.)			h	med
<i>Trisateles emortualis</i> D. & S., 1775			v	sib
<i>Paracolax derivalis</i> HB., 1796 (= <i>P. glaucinalis</i> D. & S.)			s	H sib
<i>Hypena crassalis</i> F., 1787			+ s	W pon
<i>Hypena rostralis</i> L., 1758			+ s	med
<i>Hypena proboscidalis</i> L., 1758			h	med

4.10.4.2 Besonders bemerkenswerte Schmetterlingsarten

Heterogenea asella (RL A.2) - Kleine Schildmotte

Diese Art wurde bisher im Rheinland immer nur in Einzelexemplaren gefunden. Der unscheinbare, kleine Falter wird sicherlich häufig übersehen oder mit einer Mikrolepidoptere (Kleinschmetterling) verwechselt. Im Untersuchungsgebiet gelang ein Nachweis am Rande eines Laubmischwaldes. Die Raupe dürfte nach Literaturangaben (z.B. FORSTER & WOHLFAHRT 1960) hauptsächlich an Hain- oder Rotbuche zu finden sein. Ihr Nahrungsspektrum ist jedoch weitaus umfangreicher als bislang angenommen. So fanden RENNWALD & RENNWALD (1992) in Baden-Württemberg *Heterogenea asella*-Raupen an weiteren 14 Laubholzarten, u.a. Winter-Linde (*Tilia cordata*), Süßkirsche (*Prunus avium*) und Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*). Der Falter fliegt im Juni und Juli.

Luffia ferchaultella (RL A.2) - Felsen-Sackträger (Abb. 4.10/11a)

Diese ganz lokal vorkommende, parthenogenetische Psychidenart wurde erstmals am 25.06.1977 als Neufund für die BRD im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (SWOBODA 1978). Die Sackträger-räupchen kommen hier an einem glatten, mit Flechten besetzten Felsen in Nähe der Ahr jahrweise häufig vor. Starke Sonneneinstrahlung bei Tage sowie Feuchtigkeit an einigen Stellen durch kleine Wasserrinnale scheinen die Entwicklung der Art zu begünstigen. In den darauffolgenden Jahren konnte die Art durch den Nachweis der Säckchen an der Loreley (NIPPEL 1980), bei Plaidt/Bifel (KINKLER & SCHMITZ 1982) sowie bei Kestert/Mittelrhein und Oberhausen-Schloßböckelheim/Nahe (BLÄSIUS & HERRMANN 1991) an ähnlichen Stellen gefunden werden. An einer engbegrenzten Lokalität bei Oberhausen/Nahe besiedelt die Art darüber hinaus neben den heißen Felsen auch die angrenzenden Baumstämme des Französischen Ahorns (*Acer monspessulanum*) und der Eichen.

Ipchilides podatirius (RL A.1) - Segelfalter (Abb. 4.10/7a-c, S. 559)

Diese Art ist ein Bewohner der Felsheiden. Ihr Vorkommen im Rheinland konzentriert sich auf die Wärmegebiete von Mittelrhein, Mosel, Nahe und Ahr. Im Engtalbereich der Ahr erreicht der Falter die Nordgrenze der aktuellen Verbreitung (KINKLER 1991). Seine Raupen ernähren sich von *Prunus spinosa* (Schlehe) und *Prunus mahaleb* (Weichselkirsche). Wie J. Knoblauch (in KINKLER 1991) zeigen konnte, wird im Bereich der Ahr die Schlehe als Eiablagepflanze bevorzugt, während auf alle Vorkommen in Rheinland-Pfalz bezogen die Weichselkirsche als Hauptfutterpflanze deutlich dominiert. Der Falter fliegt vorwiegend auf der Krähhardt und den benachbarten Felskuppen der Engelsley und des Teufelsloches oberhalb Altenburg (KINKLER 1991). Im Mai und Juni ist hier die Frühjahrs-Generation zu beobachten. In klimatisch günstigen Jahren entwickelt sich auch eine partielle zweite Generation im Juli und August. Der Bestand des Segelfalters auf der Krähhardt ist durch die fortschreitende Verbuschung dieses Raupenbiotops sehr stark gefährdet, da die weiblichen Individuen für die Eiablage zumeist stark besonnte, einzeln stehende Pflanzen auswählen. Hierbei ist das bodennahe Mikroklima der Standorte entscheidend (WEIDEMANN 1986, 1988). Eine teilweise Entbuschung auf der Krähhardt - wie bereits geschehen - ist für die Bestandserhaltung der Art notwendig. Von dieser Pflegemaßnahme würden auch der Große Perlmutterfalter (*Mesoacidalia aglaja*) und das Schachbrett (*Melanargia galathea*) profitieren. Eine detaillierte Analyse der Populationssituation des Segelfalters in Rheinland-Pfalz mit Vorschlägen zu bestandserhaltenden Maßnahmen liefert KINKLER (1991).

Lasiommata maera (RL A.4) - Braunauge

Diese in zwei Generationen im Mai/Juni und Juli-September anzutreffende Art bevorzugt im Vergleich zu ihrer Schwesterart *Lasiommata megera* (Mauerfuchs) die offenen Felshänge. Diese sind im Untersuchungsgebiet noch intakt und bedürfen keiner Pflegemaßnahmen.

***Satyrium acaciae* (RL A.2) - Kleiner Schlehen-Zipfelfalter** (Abb. 4.10/8, S. 560)

Diese Art erreicht an der Ahr ihre nördliche Verbreitungsgrenze. Als Futterpflanze der Raupe dienen stark besonnte Schlehenbüsche (*Prunus spinosa*). Bezüglich der Wahl der Eiablagepflanzen gilt dabei in verstärkter Weise das bereits für *Iphiclides podalirius* (Segelfalter) Gesagte: es werden insbesondere einzeln stehende, kleinwüchsige, verkrüppelte Schlehenbüsche bevorzugt (UEBEL 1971). Die vergleichbaren Ansprüche an die Strukturen des Larvalhabitats erklären das oftmals sympatrische Auftreten von *Satyrium acaciae* und *Iphiclides podalirius*. *Satyrium acaciae* fliegt im Juni und Juli bei Altenburg in größerer Anzahl in aufgelassenen Weinbergsbrachen. Auch hier darf die Verbuschung nicht überhandnehmen, doch erscheinen uns Pflegemaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht geboten. Bei eventuell durchzuführenden Entbuschungsaktionen sollten jedoch unbedingt die für die Larvalentwicklung wichtigen Krüppelschlehen erhalten werden. Dies gilt auch für die o.g. Segelfalter-Biotope.

***Satyrium w-album* (RL A.2) - Ulmen-Zipfelfalter** (Abb. 4.10/9, S. 560)

Der Ulmen-Zipfelfalter ist eine Charakterart der Hartholzauen und Schluchtwälder, findet sich jedoch auch - zumeist selten - in anderen Biotopen mit Ulmenbeständen, selbst im großstädtischen Milieu wie aktuelle Funde aus Köln belegen (WIPKING et al. 1992). Das lokalisierte Auftreten von *Satyrium w-album* in Siedlungsräumen darf nicht über die bestehende Gefährdung hinwegtäuschen, die aus dem Verlust geeigneter Auwaldbiotope resultiert. Auch dürfte das Ulmensterben vielerorts den Fortbestand der Art bedrohen. Im Untersuchungsgebiet wurde *Satyrium w-album* im Juli in der Talau bei der Nektaraufnahme beobachtet.

***Phylodesma tremulifolia* (RL A.3) - Eichen-Glucke**

Diese v.a. an der Mosel und am Mittelrhein gefundene Art fliegt im Mai und Juni an buschreichen, wärmebegünstigten Hängen im Untersuchungsgebiet. Die Raupe dürfte bevorzugt an den Eichenbüschen zu finden sein. Durch eine zu starke Entbuschung würde diese Art sicherlich seltener werden.

***Idaea vulpinaria* (RL A.3), *Idaea moniliata* (RL A.2), *Idaea dilutaria* (RL A.3), *Idaea subsericeata* (RL A.4), *Idaea contiguaria* (RL A.2), *Idaea rubraria* (RL A.3), *Idaea deversaria* (RL A.3)**

Die o.a. sieben Arten sind Bewohner der bebuschten Hanglagen bis hin zu den von der Sonne stark aufgeheizten Felspartien. Fünf Arten - *I. vulpinaria*, *I. moniliata*, *I. dilutaria*, *I. contiguaria* und *I. rubraria* (Abb. 4.10/11b) - erreichen hier ihre nördliche Verbreitungsgrenze in Westdeutschland. Die Raupen leben polyphag an niedrig wachsenden Pflanzen oder welkenden Pflanzenteilen (FORSTER & WOHLFAHRT 1981). Während *Idaea subsericeata* und *Idaea contiguaria* regional - so auch im Untersuchungsgebiet - zwei Generationen von Mai-August ausbilden, sind alle anderen Arten univoltin und werden in den Sommermonaten Juni-August beobachtet.

***Thera stragulata* (RL A.2)**

Im Gegensatz zu den übrigen *Thera*-Arten scheint *Thera stragulata* bevorzugt in den höheren Nadelwäldungen zu leben. So wurden die ersten Meldungen für das westliche Rheinland aus dem Hunsrück bekannt (KINKLER 1982b). In den letzten Jahren wurde der Falter nach eigenen Beobachtungen einzeln in der Eifel und auf dem Höhenrücken oberhalb Klotten/Mosel gefunden. Aus dem NSG "Ahrschleife bei Altenahr" stammt der Nachweis eines Einzelexemplares dieser Art.

***Triphosa dubitata* - Höhlenspanner**

Diese Art ist im Gebiet nicht selten. Der Falter überwintert hier in den häufig vorhandenen Höhlen und Nischen der Felshänge. Die Raupe lebt an *Rhamnus* (Faulbaum und Kreuzdorn) sowie an *Crataegus* (Weißdorn), aber auch an *Prunus spinosa* (Schlehe).

***Eupithecia inturbata* (RL A.2) - Feldahorn-Blütenspanner**

Der Falter wurde an den warmen, verbuschten Hängen mit *Acer campestre* (Feldahorn), an deren Blüten die Raupe lebt, Mitte August einzeln gefunden. Über die Verbreitung der Art im Rheinland s. SCHMITZ (1989a).

***Eupithecia egenaria* (RL A.2) - Linden-Blütenspanner**

Als Baumkronenbewohner wird der Falter Ende Mai bis Mitte Juni selten beobachtet. Die Art ist in der Ville bei Brühl lokal häufig (M. Forst, Köln und H.-J. Weigt, Schwerte, mdl. Mitt. 1992). Aus dem übrigen Rheinland sind bisher nur wenige Einzelfunde bekannt. Die Raupe lebt an den Blüten und Früchten von *Tilia cordata* (Winterlinde) und *Tilia platyphyllos* (Sommerlinde). Ein Falter wurde oberhalb von Altenburg am Licht beobachtet.

***Eupithecia denotata* (RL A.3) - Glockenblumen-Blütenspanner**

Die Art ist in lichten Wäldern mit dem Vorkommen von *Campanula trachelium* (Nesselblättrige Glockenblume) verbreitet. Der Falter erscheint selten am Licht, während die Raupen häufig in alten Samenkapseln der Futterpflanze gefunden werden (SCHMITZ 1989c). Der Falter wurde vereinzelt im Juli und August bei Altenburg nachgewiesen.

Agriopsis bajaria

Es handelt sich um eine wärmeliebende Art, die an den verbuschten Hängen der Krähhardt im Spätherbst gefunden wurde. Die Raupe lebt vorwiegend an *Prunus spinosa* (Schlehe). So konnten der Zweitautor und H. Kinkler (Leverkusen) bei Altenahr am 30.05.1970 acht Raupen an dieser Futterpflanze beobachten.

***Gnophos furvatus* (RL A.3) - Aschgrauer Steinspanner, *Gnophos pullatus* (RL A.2) - Blaugrauer Felsen-Steinspanner (Abb. 4.10/11b)**

Diese beiden an xerotherme Felshänge gebundenen Arten sind von Mitte Juli bis Anfang August bei Altenburg sympatrisch gefunden worden. Sie haben hier ihr nördlichstes Vorkommen in Westdeutschland.

***Ptilophora plumigera* (RL A.3) - Haarschuppenspanner**

Der nach den ersten Nachtfrösten im November erscheinende Falter konnte im Untersuchungsgebiet bei W 2 nachgewiesen werden. Er kommt im Rheinland lokal an wärmebegünstigten Stellen mit den Futterpflanzen *Acer campestre* und *Acer pseudoplatanus* (Feld- und Bergahorn) vor und wird stellenweise häufig gefunden.

***Nudaria mundana* (RL A.2)**

Die Art ist ein Bewohner der mit Flechten bewachsenen Felshänge und warmer, aufgelassener Steinbrüche. Nach 1980 konnte nur ein Falter dieser unscheinbar wirkenden Art unterhalb der Krähhardt im Nordteil von W 3 nachgewiesen werden.

***Opigena polygona* (RL A.3)**

Die schon seit langem von der Nahe und dem Mittelrhein bekannte pontomediterrane Art hat sich in den letzten Jahren stark nach Norden ausgebreitet (SCHMITZ 1989b). So konnte der Falter auch hier in einigen Exemplaren im Juli/August am Licht beobachtet werden. Er scheint warm besonnte Hänge zu bevorzugen.

Egira conspicularis

Die Art ist an warmen, buschigen Hängen mit größeren Ginsterbeständen, z.B. auf der Krähhardt, im Frühjahr als Falter nicht selten.

***Valeria oleagina* (RL A.2) (Abb. 4.10/11a)**

Sie ist an warmen, buschigen Hängen und auf Felssteppen mit *Prunus spinosa* und *Crataegus* (Weißdorn), z.B. auf der Krähhardt, im März mehrfach gefunden worden. Über die Erhaltung dieser Biotope gilt das für *Phyllosma tremulifolia* Gesagte. Die Art erreicht hier im Ahrtal ihre nördliche Verbreitung in Westdeutschland.

***Dichonia aprilina* - Grüne Eicheneule**

Die Art ist außerhalb der warmen Eichenwälder an den Mosel- und Mittelrhein-Hängen im Rheinland nur noch selten gefunden worden. Im Untersuchungsgebiet konnten zwei Nachweise Mitte Oktober erbracht werden.

***Omphaloscelis lunosa* (RL A.4) - Westliche Wollscheneule**

Seit den Erstfunden für Deutschland aus dem Jahre 1935 bei Elmpt und Stenden am Niederrhein (DAHM & JUNG 1936: S. 9-12) hat sich die Art langsam der Rheinschiene entlang nach Südosten ausgebreitet (KINKLER 1972). Seitdem ist sie an den bekannten Fundstellen häufiger geworden und hat ihr Areal weiter nach Süden erweitert. Im Herbst 1989 konnte sie erstmals in Nahbollenbach/Nahe als südlichstem Fundort im Rheinland beobachtet werden (FÖHST 1990). Fehlte sie noch in den Jahren 1966-1980 im Untersuchungsgebiet (KINKLER et al. 1980), so konnte sie jetzt in Anzahl nachgewiesen werden.

***Cryphia ravula* (RL A.3) - Wandflechten-Algeneule (Abb. 4.10/11a)**

Die Art wurde an den heißen Felssteppenhängen, z.B. bei Altenburg, Anfang August gefunden. Sie erreicht hier ihre nördlichste Verbreitung in Westdeutschland. Die Raupe lebt vermutlich an Steinflechten.

***Phlogophora scita* (RL A.2) - Waldfarn-Smaragdeule**

Die Art ist ein Bergwaldbewohner, der einmal am Rande eines Laubmischwaldes bei Altenburg gefunden wurde. Die Verbreitung dieser im Rheinland seltenen Art beschränkt sich auf die feuchteren Wälder des Berglandes, z.B. der Eifel, des Westerwaldes und des Hunsrücks (STAMM 1981). Der Lebensraum dieses Falters im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" dürfte in den Hochwäldern, z.B. oberhalb von Altenburg, zu suchen sein. Die Raupe lebt an Farnarten, vorwiegend an dem häufigen *Dryopteris filix-mas* (Wurmfarn).

***Apamea unanimitis* (RL A.4)**

Diese hauptsächlich in den Flußniederungen des nördlichen Rheinlandes verbreitete Art wird in Rheinland-Pfalz seltener gefunden. Ein Einzelfund stammt aus der Ahrtaale am Rande einer Feuchtwiese. Die Raupe lebt nach FORSTER & WOHLFAHRT (1971) an Sumpfgäsern, vorwiegend an *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras).

Mesoligia literosa (RL A.3)

Wie *Opigena polygona* ist auch *Mesoligia literosa* eine im Rheinland in Ausbreitung begriffene Art, die erst in den letzten Jahrzehnten selten gefunden wird (SCHMITZ 1967, KINKLER 1982a). Nach dem Erstfund für das Gebiet am 02.08.80 bei Altenburg konnten weitere Exemplare dieser Art im neueren Untersuchungszeitraum beobachtet werden, so z.B. zwei Falter am 06.08.88. Es besteht keine strenge Biotopbindung.

Minucia lunaris (RL A.4) - Braunes Ordensband

Die Art wurde an den mit Eichen - der Futterpflanze der Raupe - verbuschten, warmen Hängen und Waldrändern des NSG "Ahrschleife bei Altenahr" einige Male im Mai gefunden.

4.10.4.3 Bewertung des Artenspektrums

Mit Hilfe der eingangs beschriebenen Methoden wurden von 1986-1988 567 Arten nachgewiesen. Davon waren 130 neu für das Gebiet. Bei den Untersuchungen zwischen 1966-1980 (KINKLER et al. 1980) wurden 475 Arten gemeldet. Hiervon konnten 38 Arten im neueren Untersuchungszeitraum nicht mehr festgestellt werden. D.h. 92% aller von KINKLER et al. (1980) nachgewiesenen Arten konnten in ihrem Vorkommen bestätigt werden. Der größte Teil der Neufunde ist auf verbesserte Fangmethoden und die intensivere Untersuchung zurückzuführen. So brachte auch der Licht- und Köderfang im zeitigen Frühjahr und späten Herbst mehr als 40 neue Arten. Da einige Beobachter nur qualitative Daten übermittelt haben, können die Angaben zur relativen Häufigkeit nur einen Anhaltspunkt für die reale Populationsstärke sein.

Von den insgesamt 605 bislang im Untersuchungsgebiet registrierten Großschmetterlingsarten gelten nach der Roten Liste Rheinland-Pfalz (BLÄSIUS et al. 1987) 183 Arten (30,2%) als in ihrem Bestand gefährdet. Die Aufteilung in die einzelnen Gefährdungskategorien ist der Tab. 4.10/2 zu entnehmen.

Gut die Hälfte der im Gebiet nachgewiesenen Arten (308) lassen unseres Erachtens eine deutliche Biotopbindung erkennen (Abb. 4.10/10). Hierbei wurde vor allem der Larvalbiologie Rechnung getragen. Es sei jedoch betont, daß eine Reihe von Arten nicht ausschließlich auf den genannten Biotoptyp fixiert sind, sondern lediglich eine Präferenz für diesen aufweisen.

Tab. 4.10/2: Anteil der gefährdeten Arten im NSG "Ahrschleife bei Altenahr"

Gefährdungskategorie	Artenzahl	Anteil an Gesamt-Artenzahl (in %)
A.1 Vom Aussterben bedroht	1	0,2
A.2 Stark gefährdet	29	4,8
A.3 Gefährdet	87	14,4
A.4 Potentiell gefährdet	65	10,7
I Gefährdete Vermehrungsgäste	1	0,2
Summe:	183	30,2

So wurden 120 Spezies (39%) den trockenen Übergangsbereichen (Halbtrockenrasen, Ginsterheiden und verbuschende Saumgesellschaften sonnenexponierter Hanglagen/Biotoptyp H) zugeordnet. Ein fast ebenso hoher Anteil von 107 Arten (34,7%) besiedelt die im Untersuchungsgebiet reich vertretenen Laub- bzw. Laubmischwaldgesellschaften unterschiedlicher Ausprägung (Biotoptyp W), während nur 13 Arten (4,2%) als typische Nadelholzbewohner (Biotoptyp N) angesehen werden

können. 39 Spezies (12,7%) sind mehr oder weniger auf die Feuchtstandorte der Ahrtaale (z.B. Hochstaudenfluren und Auwaldbereiche/Biototyp T) beschränkt. Besonders hervorzuheben ist die Gruppe der auf die Felsfluren und Weinbergsbrachen (Biototyp X) angewiesenen 29 Arten (9,4%), meist xerophile bzw. thermophile Spezies. Aufgrund der Seltenheit solcher Biotopstrukturen und deren Gefährdungsdisposition durch drohende Verbuchung ist der Anteil gefährdeter Arten hier besonders hoch. Betrachtet man nur die 30 "Rote Liste"-Arten der Gefährdungskategorien A.1 und A.2, so überwiegen die Bewohner dieser Xerothermbiotope mit 40% (Abb. 4.10/10). Dies verdeutlicht die herausragende Stellung der Felssteppen und Weinbergsbrachen als Rückzugsgebiete wärmeliebender Arten.

Beachtenswerterweise erreichen 21 Arten im Untersuchungsgebiet die Nord- bzw. Nordwestgrenze ihrer Verbreitung in Westdeutschland. Neben *Iphiclides podalirius* (Segelfalter) handelt es sich hierbei um die in Abb. 4.10/12 dargestellten, ausnahmslos als wärmeliebend anzusprechenden Arten. So ist es nicht verwunderlich, daß der überwiegende Anteil von 18 Arten auf die bereits besonders hervorgehobenen Xerothermbiotope (Biototyp X) beschränkt ist und die restlichen drei Arten an trockenwarme Standorte des Biototyps H gebunden sind.

4.10.4.4 Zoogeographische Analyse der Schmetterlingsfauna

Im Folgenden soll eine kurze zoogeographische Analyse der Schmetterlingsfauna des NSG "Ahrschleife bei Altenahr" versucht werden, wobei sich die Verfasser der Problematik einer Zuordnung nach Faunenelementen bei polyzentrischen Arten bewußt sind. Für diese Arten, welche die Eiszeiten in mehreren Refugialzentren überdauert haben, ist die Einwanderungsrichtung der nacheiszeitlichen Besiedlung Mitteleuropas oftmals unklar. Dies soll kurz am Beispiel von *Aporia crataegi*, dem Baumweißling, skizziert werden. Das Verbreitungsareal dieser auch im Untersuchungsgebiet beobachteten Art reicht von Nordafrika durch ganz Europa (mit Ausnahme Großbritanniens, wo die Art ausgerottet wurde, und Nordskandinaviens) und das paläarktische Asien bis nach Japan. Bereits FORST & GROSS (1975) verweisen in ihrer zoogeographischen Analyse der Schmetterlinge des Bausenbergs auf die Schwierigkeit, Arten mit einem solchen Verbreitungsmuster einem bestimmten Faunenelementtyp zuzuordnen, da die postglaziale Besiedlung des untersuchten Gebietes aus mehreren Refugialräumen stattgefunden haben kann. Im Fall von *Aporia crataegi* kommen sie aufgrund der Merkmale der rheinischen Populationen zu dem Schluß, daß die Einwanderung aus dem Osten erfolgt ist. DE LATTIN (1957) hingegen stellt die Pfälzer Populationen zur ssp. *transiens* LEMPKE, "die offenbar alle Populationen des südlichen Mitteleuropas umfaßt... Alle diese Tiere sind von der schwedischen Nominatform, zu der auch noch die Falter Norddeutschlands (z.B. von Mariensee b. Hannover) zu rechnen sind, deutlich verschieden." Infolgedessen bescheinigt DE LATTIN (1957) den Pfälzer *Aporia crataegi* - anders als den Norddeutschen - Populationen eine mediterrane Herkunft.

Für die polyzentrischen, meist weit verbreiteten Arten des NSG "Ahrschleife bei Altenahr" wurden die von DE LATTIN (1957) für die Pfälzer Populationen aufgestellten Faunenelementsbezeichnungen übernommen, ohne daß für jede Art geprüft wurde, ob die im Untersuchungsgebiet fliegende geographische Rasse von der in der Pfalz verbreiteten Refugialrasse abweicht. Hieraus ergeben sich gewisse Unterschiede zu der bei FORST & GROSS (1975) getroffenen Einteilung der Arten in die entsprechenden Faunenelementtypen. So werden die Arten mit dem oben beschriebenen Verbreitungsmuster von den beiden Autoren grundsätzlich dann dem sibirischen Faunenelement zugeordnet, wenn auch eine eindeutige Klärung der Herkunft der rheinischen Populationen noch aussteht. Im Gegensatz hierzu tendiert DE LATTIN (1957) zu einer stärkeren Gewichtung des (holo-)mediterranen Faunenelementes bei den polyzentrischen Arten, und zwar auch bei den Spezies, deren Nominatrasse dem sibirischen Faunenelement zuzuordnen ist und deren Pfälzer Populationen keine morphologische Unterschiede zur Nominatrasse erkennen lassen. Diese Arten haben sich also trotz der eiszeitlichen Isolation der Refugialrassen offensichtlich nicht zu eigenen Unterarten differenziert (z.B. *Anthocharis cardamines*, Aurorafalter, und *Gonepteryx rhamni*, Zitronenfalter).

Abb. 4.10/10: Verteilung des Arteninventars auf bestimmte Lebensräume

a) Biotopbindung aller 308 Arten, die deutliche Präferenzen für bestimmte Lebensräume besitzen

b) Biotopbindung der Roten Listen - Arten der Gefährdungskategorien A.1 und A.2

Legende zur Abb. 4.10/10:

- N Nadelwald (Fichtenhochwald und Kiefernauflorstungen)
 X xerotherme Felsfluren, Weinbergsbrachen und Standorte mit ähnlichen mikroklimatischen Verhältnissen
 T Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren des Ahrtales sowie Auenwaldgesellschaften
 W naturnahe Waldgesellschaften (Laubmischwald) unterschiedlicher Ausprägung einschl. der Waldsäume und -lichtungen
 H Halbtrockenrasen, Ginsterheiden und verbuschende Saumgesellschaften sonnexponierter Hanglagen

Abb. 4.10/11: Arten, die im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" ihre nördliche bzw. nordwestliche Verbreitungsgrenze in Westdeutschland erreichen.

a) von links nach rechts:

oben: *Satyrrium acaciae* (Kleiner Schlehen-Zipfelfalter), *Eilema caniola* (Gelbsaum-Flechterspinner), *Dysauxes ancilla* (Braunes Fleckwidderchen), *Luffia ferchaultella* (Felsen-Sackträger, Säckchen) und *Eumasia parietariella* (Gräuliche Sackmotte, Säckchen)

Mitte: *Epilecta linogrisea* (Silbergraue Bandeule), *Chersotis multangula* und *Cucullia xeranthemi*

unten: *Valeria oleagina* (Olivgrüne Schmuckeule), *Cryphia ravula* (Wandflechten-Algeneule) und *Hoplo-drina superstes*

b) von links nach rechts:

oben: *Idaea dilutaria*, *I. vulpinaria*, *I. rubraria*;

Mitte: *I. Contiguaria*, *Gnophos furvatus* (Aschgrauer Steinspanner), *Idaea moniliata*;

unten: *Perizoma hydrata*, *Gnophos pullatus* (Blaugrauer Felsen-Steinspanner), *Nebula salicata*
(Fotos: Dr. D. Stüning)

Abb. 4.10/12: Faunenelementzugehörigkeiten aller 605 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Spezies

Legende zur Abb. 4.10/12:

med	holomediterran	kas	kaspisch
atf	atlantisch/atlantomediterran	sib	sibirisch/mongolisch/mandschurisch
adr	adriatomediterran	eur	mittel- und nord- bzw. gesamteuropäisch
pon	pontisch/pontomediterran	euras	eurasiatisch

Bei gut 80% der insgesamt 605 Großschmetterlingsarten des Untersuchungsgebietes handelt es sich um holomediterrane und sibirische Faunenelemente (Abb. 4.10/12). Dies steht in Einklang mit der von FORST & GROSS (1975) skizzierten Situation, wonach etwa 85% der rheinischen Arten den beiden Faunenelementen zuzuordnen sind, obschon aus den genannten Gründen der relative Anteil der sibirischen (incl. der mongolischen und kaspischen) Arten mit 65% den Anteil der mediterranen (incl. adriatomediterranen) Arten von ca. 20% deutlich übersteigt. In weiterer Übereinstimmung mit FORST & GROSS (1975) überwiegen im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" die pontischen Elemente (6,9%) gegenüber den atlantischen und adriatischen Elementen (3,1% bzw. 1,8%). Dennoch liegt der relative Anteil der atlantischen bzw. atlantomediterranen Arten im Gebiet gut dreimal so hoch wie im kontinental beeinflussten Naturpark "Hoher Vogelsberg" (BAUMANN 1967: 0,8%). 3,1% der Arten können derzeit noch keinem Faunenelementtyp zugeordnet werden, und 1,3% der Arten sind kaspischen, europäischen (mittel- und nordeuropäischen bzw. gesamteuropäischen) oder eurasiatischen Ursprungs.

Der relativ hohe Anteil pontischer bzw. pontomediterranen Faunenelemente im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" mag überraschen und dürfte z.T. aus den mikroklimatischen Gegebenheiten resultieren. So werden von jenen pontischen Arten im NSG, die bestimmte Biotoppräferenzen erkennen lassen, hauptsächlich die verbuschenden Saumgesellschaften sonnexponierter Hanglagen, Ginsterheiden und Halbtrockenrasen (Biotoptyp H, Tab. 4.10/1: 15 Arten) besiedelt, während nur fünf Spezies auf die Waldgesellschaften (Biotoptypen W+N) beschränkt sind. Das Verhältnis H:(W+N)

ist also bei den pontischen Arten mit 3:1 deutlich höher als bei der Gesamtheit aller betrachteten Arten mit 1:1 (Abb. 4.10/10a). Immerhin drei pontische Arten erreichen im Untersuchungsgebiet die Nordgrenze ihrer Verbreitung in Westdeutschland: *Iphioides podalirius* (Segelfalter), *Satyrion acaciae* (Kleiner Schlehen-Zipfelfalter) und *Idaea rubraria*. Der weitaus überwiegende Teil der Arten mit nordwestlicher Verbreitungsgrenze im Gebiet (Abb. 4.10/12) ist jedoch holomediterranen Ursprungs.

4.10.5 Schlußbetrachtung

Die schon in der Einleitung beschriebenen Gefährdungsdiskpositionen der einzelnen Biotope machen für einige Teile des Untersuchungsgebietes Pflegemaßnahmen notwendig. Die natürlicherweise baumfreien Bereiche (Felsfluren) und die natürlichen Laubmischwälder sind unserer Meinung nach z.Z. nicht gefährdet.

Viele Falterarten haben sich an menschliche, extensive Wirtschaftsmaßnahmen angepaßt. Durch die Aufgabe der traditionellen Bewirtschaftungsweise ist in vielen Teilen des NSG "Ahrschleife bei Altenahr" das Fortbestehen dieser Arten gefährdet. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, daß gerade die unbewirtschafteten Weinbergshänge und die Krähhardt dringendst regelmäßiger Pflegemaßnahmen bedürfen. Soweit dies nicht bei den Kommentaren zu den einzelnen Arten geschehen ist, verweisen wir auf Vorschläge verschiedener Autoren (KUDRNA 1986, SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ 1987 und EBERT & RENNWALD 1991). Auch in der Roten Liste der bestandsgefährdeten Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz finden sich Hinweise auf Pflegemaßnahmen (BLÄSIUS et al. 1987).

Es bleibt anzumerken, daß keine Pflegemaßnahmen die traditionelle und extensive Bewirtschaftungsweise vollkommen ersetzen können. Jeder Eingriff in Form einer Pflegemaßnahme fördert einzelne Arten und verdrängt dabei andere. Deshalb erscheint uns ein wirksamer Schmetterlingsschutz nur in Absprache mit Naturschützern der anderen Fachrichtungen (z.B. Botanik und Ornithologie) sinnvoll und vernünftig. Somit müssen Pflegemaßnahmen mit allen beteiligten und betroffenen Gruppen koordiniert werden.

4.10.6 Zusammenfassung

Dieser Beitrag zum Erfassungsprogramm NSG "Ahrschleife bei Altenahr" (BÜCHS et al. 1989), das durch die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR) unterstützt wurde, stellt die Ergebnisse einer dreijährigen (1986-1988) Erfassung der Makrolepidopteren im Untersuchungsgebiet vor. Im genannten Untersuchungszeitraum konnten insgesamt 567 Großschmetterlingsarten nachgewiesen werden. 92% der 475 von 1966-1980 registrierten Arten (KINKLER et al. 1980) wurden in ihrem Vorkommen bestätigt. Durch den Erstnachweis von 130 Arten erhöht sich die Gesamtartenzahl im NSG "Ahrschleife bei Altenahr" auf 605 Spezies, wovon 183 Arten (30,2%) nach der Roten Liste Rheinland-Pfalz (BLÄSIUS et al. 1987) als gefährdet gelten. Alleine 21 Arten haben hier ihre nördlichsten Vorkommen im westlichen Deutschland. Die Biotopstrukturen und ihre Gefährdungsdiskpositionen werden beschrieben. Hierbei wird insbesondere die Bedeutung der Xerothermbiotope als Refugien wärmeliebender Arten herausgestellt. Der Bewertung des Artenspektrums folgt eine zoogeographische Analyse der Lepidopterenfauna. Es wird auf die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen in einigen Teilen des NSG "Ahrschleife bei Altenahr" hingewiesen.

Danksagung

Wir danken hier an dieser Stelle für die Überlassung der vielen Daten den folgenden Mitarbeitern, ohne die die Artenliste nicht so umfangreich geworden wäre: D. Förster (Rostock), T. Ottmüller (Bergisch Gladbach), V. Pelz (Ruppichteroth), J. Rodenkirchen (Köln), M. Schaub (Köln), B. Schmitz (Odenthal), H. Schumacher (Ruppichteroth), J. Viehmann (Bergisch Gladbach), D. Woizilinski (Hilden). Ferner möchten wir den Herren Dr. K. Cölln (Köln), Dr. N. Mohr (Bergisch Gladbach), Dr. S. Risch (Köln), Dr. M. Sorg (Neukirchen-Vluyn) und Dr. W.

Wendling (Altenahr-Altenburg) für die Aufstellung und Leerung der Malaise- und Oliver-Fallen sowie den Herren Dr. W. Büchs (Braunschweig), Dr. J. C. Kühle (Bonn) und Dr. D. Teschner (Braunschweig) für die Bereitstellung und Vorsortierung des Materials aus den Malaise- und Oliver-Fallen sowie aus den Borkenemergenz- und Bodenphotoeklektoren danken. Unser Dank gilt weiterhin den Herren B. Marin (Remscheid) und J. Rodenkirchen (Köln) für die Überlassung des Bildmaterials und schließlich auch Herrn Dr. D. Stüning (Bonn) für die Photographien des präparierten Sammlungsmaterials.

4.10.7 Literatur

- BAUMANN, E. (1967): Eine erste Bestandsaufnahme und zoogeographische Analyse der Großschmetterlinge im Naturpark "Hoher Vogelsberg". - Ber. Oberhess. Ges. Natur- u. Heilkde., N. F., Naturwiss. Abt. **35**, 53-92.
- BLAB, J. & O. KUDRNA (1982): Hilfsprogramm für Schmetterlinge. - 135 S., Greven, Kilda Verlag.
- BLÄSIUS, R., BLUM, E., FASEL, P., FORST, M., HASSELBACH, W., KINKLER, H., KRAUS, W., RODENKIRCHEN, J., RÖSLER, R. U., SCHMITZ, W., STEFFNY, H., SWOBODA, G., WEITZEL, M. & W. WIPKING (1987) - In: MINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT (Hrsg): Rote Liste der bestandsgefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera: Tagfalter, Spinnerartige, Eulen, Spanner) in Rheinland-Pfalz. - 33 S., Mainz, Universitätsdruckerei und Verlag H. Schmidt.
- BLÄSIUS, R. & R. HERRMANN (1991): *Luffia lapidella* GOEZE 1783 f. *ferchaultella* STEPHENS 1850 auch im Nahetal (Lep., Psychidae). - *Melanargia* **3**, 156-159.
- BÜCHS, W. (1993): 1.1 Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" - Synoptische Einführung in das Untersuchungsgebiet sowie in die Hintergründe, Modalitäten, Methoden und Ergebnisse der zoologischen und botanischen Intensivfassung. - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 9-73, 545-548.
- BÜCHS, W., KÜHLE, J. C., NEUMANN, C. & W. WENDLING (1989): Untersuchungen zur Fauna und Flora im Großraum Altenahr - ein Beitrag zur Charakterisierung eines Naturraumes. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal, **42**, 225-237.
- DAHM, C. & H. JUNG (1936): Die Großschmetterlinge des linken Niederrheins. I. Nachtrag. - Dt. Ent. Z. *Iris* **50**, 3-149.
- EBERT, G. & E. RENNWALD (1991): Tagfalter. - In: EBERT, G. (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs 2 Bände, Stuttgart, Ulmer.
- EITSCHBERGER, U. & H. STEINIGER (1992): Papilionidae und Pieridae 1991 (Jahresbericht der DFZS). - *Atlanta* **23**(3/4), 323-337
- FISANG, R. (1993a): 2.2 Das Georelief und die Böden im Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr". - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 85-118, 562-563, 566.
- FISANG, R. (1993b): 2.3 Zum Klima des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr". - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 119-132, 564-565.
- FISANG, R. (1993c): 2.4 Hydrologische Betrachtung des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr". - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 133-155.
- FÖHST, P. (1990): Die Herbsteule *Omphaloscelis lunosa* HAWORTH 1809 nun auch an der Nahe gefunden (Lep., Noctuidae). - *Melanargia* **2**, 12.
- FORST, M. & F. J. GROß (1975): Die Schmetterlingsfauna des Bausenberges (Eifel). - Beitr. Landespl. Rheinl.-Pfalz **4**, 343-364.
- FORSTER, W. & T. A. WOHLFAHRT (1955-1981): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. - Band II-V, Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung.
- HIGGINS, L. G. & N. D. RILEY (1978): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. - 2. Auflage, 377 S., Hamburg und Berlin, Parey.
- KINKLER, H. (1972): Zur Verbreitung von *Omphaloscelis lunosa* in Deutschland (Lep., Noctuidae). - Ent. Z. **82**, 221-224.

- KINKLER, H. (1982a): *Miana literosa* HAWORTH 1809 in Ausbreitung begriffen? (Noctuidae). - Mitt. Arbeitsgem. rhein.-westf. Lepidopterol. **3**, 129.
- KINKLER, H. (1982b): *Thera stragulata* HÜBNER 1809 neu für das Arbeitsgebiet (Geometridae). - Mitt. Arbeitsgem. rhein.-westf. Lepidopterol. **3**, 131.
- KINKLER, H. (1991): Der Segelfalter (*Iphiclides podalirius* L.) in Rheinland-Pfalz - ein Artenschutzprojekt. - Beitr. Landespf. Rheinl.-Pfalz **14**, 7-94.
- KINKLER, H. & W. SCHMITZ (1982): Ein weiterer Fundort von *Luffia ferchaultella* STEPHENS 1850 in der Bundesrepublik (Psychidae). - Mitt. Arbeitsgem. rhein.-westf. Lepidopterol. **3**, 129.
- KINKLER, H., SCHMITZ, W. & G. SWOBODA (1980): Beitrag zur Schmetterlingsfauna des geplanten Naturschutzgebietes "Ahrschleife" bei Altenahr (Rheinland-Pfalz), (Insecta, Lepidoptera). - Ornithologie und Naturschutz: Westerwald - Mittelrhein - Mosel Eifel Ahr, Heft **2**, 210-221.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - 2. Auflage, 792 S., Melsungen, Verlag Neumann-Neudamm.
- KUDRNA, O. (1986): Aspects of the Conservation of Butterflies in Europe. - Butterflies of Europe, Band **8**, 323 S., Wiesbaden, AULA-Verlag.
- LATTIN, G. DE (1957): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz, I. Teil. - Mitt. Pollichia **4**, 51-167.
- LATTIN, G. DE, HEUSER, R., JÖST, H. & R. ROESLER (1959-1966): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz, II-IV. Teil. - Mitt. Pollichia **6**, **7**, **9**, **11**, **13**, 538 S.
- LERAUT, P. (1980): Liste systematique et synonymique des lepidopteres de France, Belgique et Corse. - 334 S., Paris, Suppl. de Alexanor.
- MEYER, W. (1993): 2.1 Die Geologie der Umgebung von Altenahr. - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 77-84.
- NIPPEL, F. (1980): Lepidopterologische (Insecta, Lepidoptera) Beobachtungen während einer Wochenendexkursion der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Wuppertal in das Loreleygebiet (Mittelrhein) mit einem zweiten Fundort von *Luffia ferchaultella* STEPHENS 1850 (Lepidoptera, Psychidae) in der Bundesrepublik Deutschland. - Mitt. Arbeitsgem. rhein.-westf. Lepidopterol. **2**, 132-135.
- RENNWALD, E. & K. RENNWALD (1992): Ökologische Beobachtungen an Schildmotten, insbesondere an *Heterogenea asella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Baden-Württemberg (Lep., Limacodidae). - Atlanta **23**, 549-572.
- RISCH, S. (1993): 4.8 Die Wildbienenfauna (Hymenoptera, Aculeata: Apidae) des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr" und benachbarter Gebiete. - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 415-427, 555.
- SCHMITZ, W. (1967): *Miana literosa*, neu für das Rheinland (Lep., Noctuidae). - Ent. Z. **77**, 94-95.
- SCHMITZ, W. (1989a): Über die bisherige Verbreitung von *Eupithecia inturbata* HÜBNER 1817 im Rheinland (mit Karte). - Melanargia **1**, 2-4.
- SCHMITZ, W. (1989b): Über die Verbreitung von *Opigena polygona* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 im Rheinland (Lep., Noctuidae). - Melanargia **1**, 46-47.
- SCHMITZ, W. (1989c): Über die Verbreitung von *Eupithecia denotata* HÜBNER 1813 im Rheinland (Lep., Geometridae). - Melanargia **1**, 57-60.
- SCHWEIZERISCHER BUND FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten-Gefährdung - Schutz. - 516 S., Basel, Selbstverlag.
- SORG, M. (1993): 4.7 Grab- und Wegwespen (Hymenoptera, Aculeata: Sphecidae et Pompilidae) des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr" und einer angrenzenden Weinbergsbrache. - In: BÜCHS, W. et al. (1993): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **16**, 405-413.
- STAMM, K. (1981): Prodromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens. - 228 S., Solingen, Selbstverlag.
- SWOBODA, G. (1978): *Luffia ferchaultella* STEPHENS 1850 (Lep. Psychidae) auch für die Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen. - Mitt. Arbeitsgem. rhein.-westf. Lepidopterol. **1**, 56-60.

UEBEL, W. (1971): Die Lycaeniden Südwestdeutschlands und ihre Verbreitung, Teil I. - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart 6, Sonderh. 8 (Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Lepidoptera, Lycaeniden I), 27 S.

WIPKING, W., FORST, M., KUHNA, P., RODENKIRCHEN, J. & O. SCHMITZ (1992): Untersuchungen zur Großschmetterlingsfauna der Großstadt Köln (Insecta: Lepidoptera). - Decheniana-Beihefte 31, 251-340.

WEIDEMANN, H.-J. (1986, 1988): Tagfalter, 2 Bände. - 654 S., Melsungen, Verlag Neumann-Neudamm.

Anschriften der Verfasser:

Dipl.-Biol. Oliver Schmitz
Mutzer Heide 29
D-51467 Bergisch Gladbach

Willibald Schmitz
Mutzer Heide 29
D-51467 Bergisch Gladbach

Dipl.-Biol. Franz A. Ladda
Drachenfelsweg 2
D-53424 Remagen